

## EXAMES CARDIOLÓGICOS

ECO BIDIMENSIONAL COM DOPPLER	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica.</li><li>- Necessário agendamento.</li><li>- Este exame é feito somente em pessoas com mais de 12 anos. Abaixo dessa faixa etária, realiza-se o ecocardiograma infantil (não disponível na MAGSCAN).</li></ul> <p><b>Preparo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Não há necessidade de suspender as medicações em uso.</li><li>- Clientes do sexo feminino não devem vir para o exame usando vestido, pois há necessidade de tirar a blusa ou camisa e o sutiã.</li><li>- No dia marcado, o cliente não pode praticar esportes nem realizar esforço físico antes do exame.</li></ul> <p>Caso possua outros exames que necessitem esforço físico como teste ergométrico em esteira ou bicicleta ou ainda testes que envolvem aplicação de alguma medicação, recomendamos a marcação do ecocardiograma antes destes exames.</p>
TESTE ERGOMÉTRICO (ELETROCARDIOGRAMA DE ESFORÇO)	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</li><li>- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um adulto responsável no dia da avaliação.</li><li>- O cliente tem de apresentar os exames cardiológicos realizados nos últimos dois anos, além de informar os medicamentos tomados nos últimos cinco dias.</li><li>- O limite de peso para a execução do teste ergométrico é de 150 kg.</li><li>- Portadores de Marca-passo: Trazer cópia da carteirinha do marca-passo contendo as informações do equipamento.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nas 24 horas anteriores ao exame, a pele do tórax não deve receber cremes, pomadas, bronzeadores ou qualquer substância oleosa.</li><li>- No dia do exame, o cliente não deve fazer exercícios físicos, ingerir bebidas alcoólicas nem bebidas que contenham cafeína (ex.: chá mate, café, coca cola)</li><li>- Tabagistas não devem fumar no dia do teste. Se isso não for possível, é necessário evitar o cigarro pelo menos nas três horas que antecedem a avaliação.</li><li>- O cliente precisa levar consigo roupas adequadas para o exercício físico (shorts ou bermuda e camiseta). O calçado deve ser preferencialmente TÊNIS. Caso não tenha tênis pode ser calçado com sola de borracha, fechado e sem salto (adequado para exercício). O exame NÃO poderá ser realizado descalço, com chinelos, croc, etc.</li><li>- Trazer toalha de rosto.</li><li>- Clientes do sexo feminino devem levar à unidade top de ginástica ou sutiã adequado para a realização do exercício.</li><li>- Para homens, pode haver necessidade de uma raspagem de pelos em alguns pontos do tórax para permitir a fixação dos eletrodos.</li><li>- É possível fazer uma refeição leve até 30 minutos antes do exame. Se o teste ergométrico for de manhã, deve-se manter o desjejum habitual (café da manhã). Se for à tarde, convém ingerir um almoço leve ou um sanduíche com suco natural. O teste não deve ser realizado em jejum.</li><li>- Não fumar 2 horas antes e 1 hora após o exame.</li> <li>- Após o exame, recomenda-se evitar a luz do sol na pele do tórax por uma semana. Em caso de necessidade de exposição solar antes desse período, o cliente precisa usar protetor com FPS maior que 30.</li></ul> <p>Suspensão de medicamentos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Todos os medicamentos em uso devem</li></ul>
--	---

	<p>ser mantidos, a não ser que o médico solicitante tenha orientado a suspensão.</p> <p><b>Contraindicações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O exame não deve ser feito na vigência de estado febril, gripe, infecções agudas, enxaqueca, diarreia, gestação ou problemas ortopédicos que impeçam a caminhada rápida.</li> <li>- Este exame deve ser realizado preferencialmente fora do período menstrual</li> </ul> <p><b>IMPORTANTE:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- É fundamental seguir rigorosamente as instruções acima, uma vez que qualquer detalhe não observado pode acarretar o adiamento do exame.</li> <li>- Chegar à unidade com, pelo menos, uma hora de antecedência.</li> </ul> <p>Anotar medicamento(s) dos últimos 5 dias.</p>
<p>HOLTER DE 24 HORAS</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Este exame deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica.</li> <li>- Este exame só é realizado em adultos e crianças maiores de 12 anos e, mesmo nestes casos, a MAGSCAN faz uma avaliação técnica no dia marcado para a instalação do aparelho, para a confirmação definitiva da possibilidade de realizar o Holter, pois crianças com muito baixo peso, hiperatividade e outras condições especiais, podem impossibilitar a realização do exame.</li> <li>- No exame em clientes pediátricos, a participação dos pais é imprescindível para a obtenção de uma qualidade adequada dos registros do eletrocardiograma: evitando que a criança manuseie o equipamento e acessórios, como apertar botões e tracionar fios, e para evitar que a criança participe de atividades esportivas intensas ou mesmo coletivas durante a realização do exame.</li> <li>- O holter não pode ser realizado na presença de queimaduras na pele do</li> </ul>

tórax, especialmente as causadas por exposição ao sol, além de alergia importante a álcool, éter ou esparadrapo.

- Não suspender os medicamentos em uso, exceto se o médico solicitante orientou a suspensão.
- Caso utilize marcapasso, trazer cópia das informações do gerador do marcapasso (modelo, série, data de implantação e limiar agudo).

**CARTEIRINHA DO MARCAPASSO.**

- Nas 24 horas anteriores ao exame, a pele do tórax não pode receber cremes, pomadas, bronzeadores ou outras substâncias oleosas.
- No dia do exame, recomenda-se que o cliente tome banho o mais próximo possível do horário da colocação do aparelho de holter, uma vez que, durante a monitorização, não é possível fazer a higiene corporal completa. - Ao comparecer à MAGSCAN, o indivíduo deve estar usando um cinto que possua uma largura máxima de 3,3cm, pois esse acessório ajuda a prender o aparelho de holter à sua cintura, e não vir com camisa ou blusa muito justa ou colada ao corpo, para evitar o risco dos eletrodos se soltarem durante a colocação ou retirada da blusa.
- Após o exame convém evitar a luz do sol na pele do tórax pelo período de uma semana. Em caso de necessidade absoluta de exposição solar, recomenda-se utilizar protetor solar com FPS superior a 30.
- É necessário retornar à MAGSCAN no dia seguinte, por volta do mesmo horário, para retirar o aparelho de Holter.
- Anotar medicamento(s) dos últimos 5 dias.

**Atenção:**

- Trazer uma pilha alcalina da marca Duracell;
- Comparecer 30 minutos antes do horário marcado;
- Manter uso das medicações;
- Se tiver marca-passo, trazer a carteirinha.
- Tomar banho antes de vir fazer o exame.
- Usar sabão neutro e uma

toalha para esfregar a pele do tórax, removendo bem a oleosidade. Não usar nenhum tipo de creme, perfume, pomada ou talco.  
Não tomar banho durante o exame.  
Ter cuidado com os movimentos para não desconectar os fios do aparelho ou os fios no próprio corpo.  
Não pegar crianças no colo.  
A entrega do aparelho deverá ser uma hora antes de completar 24hs de exame.

#### MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL, DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)

##### Instruções

- Este exame é realizado somente com solicitação médica.
- A idade mínima para a realização do exame é de 12 anos, devido à necessidade de cooperação.
- De preferência, o exame deve ser agendado em um dia de atividade normal.

##### Atenção:

- Se a circunferência do braço do cliente for muito pequena ou muito grande, pode haver limitação para a execução desta monitorização.

##### Preparo

- É necessário entregar à MAGSCAN uma relação com os nomes, as doses e os horários de tomada dos medicamentos em uso nos últimos cinco dias.
- Caso faça uso de medicamentos para pressão, confirmar com o seu médico solicitante se o exame deverá ser feito em vigência do uso destas medicações ou se elas devem ser suspensas e por quantos dias.
- No dia do exame, convém tomar banho o mais próximo possível do horário da colocação do aparelho, uma vez que, durante a monitorização, a higiene corporal completa fica dificultada.
- O indivíduo precisa comparecer à MAGSCAN com camisa de mangas curtas e largas e com cinto (preferencialmente de couro), pois esse acessório ajuda a fixar o aparelho na cintura.
- O paciente deverá trazer 04 (quatro)

	<p>pilhas alcalinas AA da marca Duracell;  - É necessário retornar à MAGSCAN no dia seguinte, por volta do mesmo horário, para retirar o aparelho de Mapa.  <b>Agendamento</b>  Este exame deve ser agendado com antecedência.</p> <p><b>IMPORTANTE</b>  Anotar medicamento(s) dos últimos 5 dias.  O paciente deverá trazer um cinto (preferência couro) para a colocação do equipamento + 04 (quatro) pilhas alcalinas AA da marca Duracell</p> <p>- Marque o exame para um dia de atividades habituais como: trabalhar, dirigir, atividades domésticas, etc. Deve-se evitar a prática de exercícios físicos durante as 24 horas que precedem o exame.</p> <p>- Venha para o exame de banho tomado e com um cinto (não será permitido tomar banho durante o exame). Em caso de uso de medicamentos, traga a lista dos mesmos com as doses e os horários de sua tomada.</p> <p>- O paciente deverá ter um dia de atividades habituais. No momento do funcionamento do aparelho o paciente deverá manter o braço em que está colocado o manguito, estendido ao lado do corpo (esticado), até que o mesmo seja totalmente desinflado. Este processo geralmente ocorre a cada 20 minutos durante o dia e a cada 30 minutos durante o período da noite, sendo o processo semelhante à medida da pressão arterial no consultório.</p> <p>- Exercícios físicos devem ser evitados durante o exame.</p>
<p>ELETROCARDIOGRAMA DE REPOUSO</p>	<p><b>Instruções</b></p> <p>Este exame é realizado somente com solicitação médica.</p> <p>Este exame é realizado por ordem de chegada de segunda a sexta-feira de 8</p>

	<p>às 16:30h e sábado de 7:30h às 11:00hs.</p> <p><b>Preparo</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adultos, não há necessidade de preparo. Apenas se recomenda que o cliente vista roupas confortáveis, que possam ser abertas na região do tórax.</li><li>- Crianças: o procedimento padrão é sempre realizar o exame sem sedação.</li><li>- Em casos de crianças agitadas (não colaborativas), em que não se consiga um traçado de qualidade satisfatória, o exame não poderá ser realizado.</li></ul> <p>Portadores de Marcapasso: Trazer cópia da carteirinha do marcapasso contendo as informações do equipamento.</p> <p><b>Cuidados após o exame</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- O cliente deve evitar a luz solar na pele do tórax pelo período de 48 horas.</li></ul> <p><b>Importante:</b> Anotar medicamento(s) do(s) último(s): 5 dias(s).</p>
MONITORIZAÇÃO AMBULATORIAL DA PRESSÃO ARTERIAL (MAPA)	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica.</li><li>- A idade mínima para a realização do exame é de 12 anos, devido à necessidade de cooperação.</li><li>- De preferência, o exame deve ser agendado em um dia de atividade normal.</li></ul> <p><b>Atenção:</b></p>

- Se a circunferência do braço do cliente for muito pequena ou muito grande, pode haver limitação para a execução desta monitorização.

### **Preparo**

- É necessário entregar à MAGSCAN uma relação com os nomes, as doses e os horários de tomada dos medicamentos em uso nos últimos cinco dias.

- Caso faça uso de medicamentos para pressão, confirmar com o seu médico solicitante se o exame deverá ser feito em vigência do uso destas medicações ou se elas devem ser suspensas e por quantos dias.

- No dia do exame, convém tomar banho o mais próximo possível do horário da colocação do aparelho, uma vez que, durante a monitorização, a higiene corporal completa fica dificultada.

- O indivíduo precisa comparecer à MAGSCAN com camisa de mangas curtas e largas e com cinto (preferencialmente de couro), pois esse acessório ajuda a fixar o aparelho na cintura.

- O paciente deverá trazer 04 (quatro) pilhas alcalinas AA da marca Duracell;

- É necessário retornar à MAGSCAN no dia seguinte, por volta do mesmo horário, para retirar o aparelho de Mapa.

### **Agendamento**

Este exame deve ser agendado com antecedência.

### **IMPORTANTE**

	<p>Anotar medicamento(s) dos últimos 5 dias.</p> <p>O paciente deverá trazer um cinto (preferência couro) para a colocação do equipamento + 04 (quatro) pilhas alcalinas AA da marca Duracell</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Marque o exame para um dia de atividades habituais como: trabalhar, dirigir, atividades domésticas, etc. Deve-se evitar a prática de exercícios físicos durante as 24 horas que precedem o exame.</li><li>- Venha para o exame de banho tomado e com um cinto (não será permitido tomar banho durante o exame). Em caso de uso de medicamentos, traga a lista dos mesmos com as doses e os horários de sua tomada.</li><li>- O paciente deverá ter um dia de atividades habituais. No momento do funcionamento do aparelho o paciente deverá manter o braço em que está colocado o manguito, estendido ao lado do corpo (esticado), até que o mesmo seja totalmente desinflado. Este processo geralmente ocorre a cada 20 minutos durante o dia e a cada 30 minutos durante o período da noite, sendo o processo semelhante à medida da pressão arterial no consultório.</li><li>- Exercícios físicos devem ser evitados durante o exame.</li></ul>
--	---

## EXAMES PNEUMOLÓGICOS

**ESPIROMETRIA COM  
BRONCODILATADOR E ESPIROMETRIA  
SEM BRONCODILATADOR**

**Critério de realização**

- Este exame deve ser agendado com antecedência.
- Este exame é realizado em clientes com idade igual ou superior à 7 anos.
- Contudo, em crianças com idade inferior a 6 anos, o exame não é feito.
- O procedimento não pode ser efetuado após exercício físico, devendo haver um intervalo de duas horas entre sua realização e a prática de atividade física.
- O cliente precisa informar à MAGSCAN os nomes das medicações em uso.
- Se disponível, o cliente deve apresentar resultado recente de hemograma, colhido nos últimos 60 dias, assim como provas funcionais ventilatórias anteriores, se houver, uma vez que estas permitem uma análise comparativa.

**Contra-indicações**

- O exame não deve ser realizado na vigência de infecções respiratórias atuais ou adquiridas nos últimos 15 dias, tais como gripe, resfriado, pneumonia ou sinusite aguda, trauma torácico, hemoptise (tosse com sangue), descolamento de retina, edema pulmonar ou angina cardíaca (dor no peito), a não ser que haja indicação médica precisa. Em caso de dúvida, recomenda-se que o cliente verifique com o médico solicitante.

**Preparo**

- Para realizar o exame, comparecer à unidade sem o uso de batom.
- A menos que o médico tenha feito expressa recomendação contrária, o uso de broncodilatadores tem de ser interrompido no dia do exame, de acordo com os intervalos abaixo:

**Suspender quatro (04) horas antes:**

Broncodilatadores de curta ação (salbutamol, fenoterol, Aerolin, Aerojet, Combivent, Duovent, Berotec, Aero-ped, Aerotrat, Abulin, Asmaliv, Broncodil, Broncocilin, Novosalmol, Pneumolat,

	<p>Salbutalin, Saltamol e Ventolin);</p> <p>Suspender doze (12) horas antes:</p> <p>Broncodilatadores de longa ação (formoterol, salmeterol, Foraseq, Foradil, Symbicort, Seretide, Serevent, Alenia e Fluir).</p> <p>-Alimentação:</p> <p>Não há necessidade de jejum, mas o cliente deve evitar uma alimentação prévia volumosa e pesada, visto que o procedimento exige esforço para realizar as manobras de sopro. O ideal é fazer uma refeição leve duas horas antes do teste;</p> <p>O cliente não pode consumir café, chá, chocolate ou bebidas alcoólicas nas seis horas que antecedem o exame;</p> <p>- Cigarro:</p> <p>Para fumantes, o teste exige um intervalo de, pelo menos, duas horas sem fumar antes de sua realização.</p>
--	--

## EXAMES NEUROLÓGICOS

<p>EEG COM MAPEAMENTO / COM FOTO ESTIMULAÇÃO / EEG EM VIGÍLIA E SONO / SONO ESPONTÂNEO OU INDUZIDO</p>	<p>Preparo</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O exame é com hora marcada, deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- Chegar com 30 minutos de antecedência.</li> <li>- Os cabelos precisam estar lavados com sabão de coco ou shampoo neutro e estar seco para a realização do EEG, não podendo conter gel, musse, laquê ou produtos finalizadores.</li> <li>- Depois da aplicação de tintura nos cabelos, é preciso aguardar um intervalo de 48 horas para realizar o exame.</li> </ul> <p>- É aconselhável a privação de sono pelo maior tempo possível:</p> <p>Adultos: dormir bem tarde, por volta de meia noite, acordar às 4h da manhã e não dormir até a hora do exame;</p> <p>Crianças ou pacientes especiais: dormir o</p>
--	---

	<p>mais tarde possível e acordar às 4h da manhã. Cansar bastante a criança. Não deixar o paciente dormir até a hora do exame. A criança não pode dormir no carro, à caminho da MAGSCAN.</p> <p>Crianças até 2 anos devem chegar à Clínica com sono e com fome. Os pais ou responsáveis precisam ter à mão mamadeira ou alimentos habituais, além dos apetrechos que o bebê utilize para dormir, tais como chupeta, travesseiros, objetos de apego, etc.</p> <p>Crianças de 2 a 12 anos devem dormir o mínimo possível na véspera ou no dia do EEG, além de estarem bem alimentadas no momento da avaliação.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Não há necessidade de interromper as medicações em uso.</li> <li>- Recomenda-se vir acompanhado no dia do exame.</li> <li>- Usuários de lentes de contato precisam retirá-las antes do eletroencefalograma (EEG).</li> <li>- A medicação feita é o hixizine, que é um antialérgico (não é sonífero), que ajuda a estimular o sono do paciente, por isso, a importância de cansar bem o paciente antes da realização do exame.</li> </ul>
<p>PREPARO PARA A REALIZAÇÃO DE EEG EM VIGÍLIA SIMPLES / ADMISSIONAL / PERIÓDICO (ADULTOS)</p>	<p><b>Preparo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- Não há necessidade de interromper as medicações em uso.</li> <li>- Recomenda-se vir acompanhado no dia do exame.</li> <li>- Usuários de lentes de contato precisam retirá-las antes do eletroencefalograma (EEG).</li> </ul> <p><b>Orientações</b></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sair de casa bem alimentado para se dirigir à MAGSCAN.</li> <li>- Os cabelos precisam estar lavados com sabão de coco ou shampoo neutro e estar seco para a realização do EEG, não podendo conter gel, musse, laquê ou produtos finalizadores.</li> <li>- Depois da aplicação de tintura nos cabelos, é preciso aguardar um intervalo de 48 horas para realizar o exame.</li> </ul>
--	--

## RESSONÂNCIA

<p style="text-align: center;"><b>ANGIO-RESSONÂNCIA</b></p> <p>Exames incluídos:</p> <p>Angio-ressonância magnética das artérias carótidas e vertebrais;</p> <p>Angio-ressonância magnética do abdome;</p> <p>Angio-ressonância magnética de aorta / ilíacas;</p> <p>Angio-ressonância magnética da aorta torácica;</p> <p>Angio-ressonância magnética do encéfalo (arterial);</p> <p>Angio-ressonância magnética do encéfalo (venosa);</p> <p>Angio-ressonância magnética de membros inferiores (arterial);</p> <p>Angio-ressonância magnética de artérias pulmonares;</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de ressonância magnética, o que é avaliado no momento do estudo, de acordo com a distribuição da gordura corporal e com a circunferência abdominal de cada pessoa. De qualquer modo, trata-se de um fator importante para os indivíduos com peso superior a 150 kg.</li> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica.</li> <li>- Pode ser feito com anestesia. Sendo obrigatória para menores de 5 anos de idade ou pessoas de qualquer idade que possuam dificuldades em colaborar.</li> </ul> <p><b>Recomendações importantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparecer à Unidade sem joias, brincos ou pulseiras. A retirada de piercings, se houver, será necessária;</li> </ul>
---	--

Angio-ressonância magnética de artérias renais.

- Estar com cabelos secos, sem uso de gel ou cremes;

- Não usar óleos corporais ou cremes analgésicos no local do estudo.

- Clientes que utilizam aparelho ortodôntico móvel precisam retirá-lo antes do exame. Os fixos, embora possam prejudicar a qualidade do exame, não apresentam risco para o cliente. Porém, No caso de o aparelho fixo gerar artefatos que impedem a avaliação do exame, será informado ao paciente, que precisará retornar com seu médico para avaliar se há possibilidade de solicitar outro exame que não gere artefatos ou se, estritamente necessária a RM, que avalie a possibilidade da remoção do aparelho ortodôntico fixo antes do exame.

- Clientes menores de 18 anos:

Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.

- Clientes acima de 70 anos:

Necessário apresentar resultado de Creatinina realizado nos últimos 60 dias.

O resultado atual de Creatinina também é necessário para clientes que apresentam os seguintes quadros:

- Doença renal aguda ou crônica
- Realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias
- Diabéticos
- Hipertensão ou gota

Clientes alérgicos a contraste

Entrar em contato com a Central de Atendimento para obter orientações

- Mulheres em período de amamentação  
Recomenda-se por precaução, interromper a amamentação por 24h após o uso do contraste, para tanto, recomenda-se que seja ordenhado o leite antes do exame, para ser oferecido à criança neste período. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento para maiores informações.

- O cliente deve apresentar exames anteriores, se houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

#### **Preparo**

- Caso tenha o hábito de tomar algum tipo de calmante, sedativo ou relaxante, poderá tomá-lo 1 hora antes do exame, na dosagem em que está habituado. Porém, deverá comparecer à Clínica acompanhado e não deverá dirigir veículo automotivo após seu uso..

- No caso de antecedentes alérgicos, informe no momento do agendamento para que seja avaliada a necessidade do uso de contraste e possivelmente de preparo antialérgico.

#### **Contraindicações:**

**É PROIBIDA A ENTRADA NAS SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PORTANDO QUALQUER OBJETO METÁLICO NO**

**CORPO (RELÓGIOS, CHAVES, BRINCOS, MOEDAS, CARTÃO MAGNÉTICO, ETC).**

**PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIAS NEUROLÓGICAS DEVEM APRESENTAR LAUDO MÉDICO INFORMANDO A MARCA E MODELO DO MATERIAL IMPLANTADO (POR EXEMPLO NO CASO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMAS) E INFORMANDO A COMPATIBILIDADE DO MATERIAL COM O CAMPO MAGNÉTICO DA RESSONÂNCIA.**

**ATENÇÃO:**

**Em caso de conter materiais metálicos não descritos aqui, o cliente deve entrar em contato com a MAGSCAN para verificar a possibilidade de realizar o exame.**

**a) Os seguintes materiais contra indicam a realização do exame:**

Marca-passo cardíaco;  
Neuroestimulador;  
Clipes de aneurisma;  
Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata);  
Implantes otológicos cocleares;  
Fixadores ortopédicos externos;  
Acidente com arma de fogo: a depender do local. Informe para verificar a possibilidade de realizar o exame.

**b) Materiais permitidos para a realização do exame:**

- Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Próteses valvares cardíacas (mesmo as metálicas);</li> <li>- Implantes ortopédicos, como próteses, pinos, parafusos e hastes (exceto os fixadores externos). Exceto se paciente inconsciente;</li> <li>- Derivação ventriculoperitoneal;</li> <li>- Dispositivo intrauterino (DIU);</li> <li>- Stents intravasculares (como Stent coronariano, por exemplo) são permitidos para a realização da ressonância <b>somente após 6 semanas de sua colocação</b>;</li> </ul> <p><b>c) Tatuagens e Maquiagem definitiva: esperar pelo menos 30 dias para realizar a RM;</b></p> <p><b>d) A RM deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 16 semanas). Caso haja dúvida em relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta-HCG sanguíneo;</b></p> <p><b>e) Portadores de clipe de aneurisma, próteses de ouvido ou expansor mamário, o exame só poderá ser realizado se comprovarem a marca e modelo de objeto utilizado, por meio de formulário, cartão de fabricante ou carta do médico informando a marca, modelo e ano de fabricação, (caso já tenha realizado RM após a colocação do objeto, trazer o laudo e imagens do dia do exame);</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>ARTRO-RESSONÂNCIA</b></p> <p>Exames incluídos</p> <p>Artro-ressonância magnética do joelho;</p>	<p><b>Informações sobre o exame</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trata-se de exame de ressonância magnética da articulação em estudo (ombro, quadril ou joelho), sem e com contraste intra-articular;</li> </ul>

Artro-ressonância magnética do ombro;  
Artro-ressonância magnética do quadril;

- Este exame é realizado em dois momentos. No primeiro o paciente deve comparecer à clínica, sem necessidade de jejum, para realizar a primeira fase do exame sem contraste articular. Em um segundo momento, também sem necessidade de jejum, deverá comparecer à Clínica para introdução intra-articular do meio de contraste paramagnético gadolínio, diluído a 1%, por punção percutânea orientada por radioscopia (Este procedimento é feito por um médico especialista) e complementação do exame novamente na ressonância.

**- Critérios de realização**

- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de ressonância magnética, o que é avaliado no momento do estudo, de acordo com a distribuição da gordura corporal e com a circunferência abdominal de cada pessoa. De qualquer modo, trata-se de um fator importante para os indivíduos com peso superior a 120 kg.

- Este exame é realizado apenas com solicitação médica.

- Necessário trazer exames anteriores, quando houver histórico de acompanhamento.

- Clientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.

- Para a realização do procedimento, é necessário comparecer à unidade com os cabelos secos, sem uso de gel ou creme, sem maquiagem ou qualquer outro cosmético em qualquer parte do

corpo, assim como, estar sem joias, brincos ou piercings.

- A região de interesse deve estar limpa e sem resíduos de cremes ou pomadas.

- Para clientes com tala gessada, são feitas todas as tentativas para realização do procedimento, porém, em casos de impossibilidade, a ressonância deve ser suspensa. A Clínica não está autorizada a retirá-la. Verifique com seu médico antes de fazer tal exame.

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

- Caso tenha o hábito de tomar algum tipo de calmante, sedativo ou relaxante, poderá tomá-lo 1 hora antes do exame, na dosagem em que está habituado.

- Não necessita jejum.

### **Contraindicações**

Os seguintes materiais são contraindicados para a realização do exame:

- ✓ Marca-passo cardíaco
- ✓ Neuroestimulador
- ✓ Clipes de aneurisma
- ✓ Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata)
- ✓ Implantes otológicos cocleares

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fixadores ortopédicos externos</li> </ul> <p>b) Materiais permitidos para a realização do exame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar</li> <li>✓ Próteses valvares cardíacas (mesmo as metálicas)</li> <li>✓ Implantes ortopédicos, como próteses, pinos, parafusos e hastes (exceto os fixadores externos)</li> <li>✓ Derivação ventriculoperitoneal</li> </ul> <p>Dispositivo intrauterino (DIU)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ "Stents" intravasculares (como "stent" coronariano, por exemplo) são permitidos para a realização da ressonância somente após 6 semanas de sua colocação.</li> </ul> <p>c) Tatuagens e Maquiagem definitiva: esperar pelo menos 30 dias para realizar a RM;</p> <p>d) A RM deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 16 semanas). Caso haja dúvida em relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta-HCG sanguíneo.</p> <p>e) Portadores de clipe de aneurisma, próteses de ouvido ou expansor mamário, o exame só poderá ser realizado se comprovarem a marca e modelo de objeto utilizado, por meio de formulário, cartão de fabricante ou carta do médico informando a marca, modelo e ano de fabricação.</p> <p>Caso já tenha realizado RM após a colocação do objeto, trazer o laudo e imagens do dia do exame.</p>
<p>RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CORAÇÃO</p>	<p>- Trata-se de exame de ressonância magnética do coração.</p>

- ESTE EXAME REQUER UM JEJUM MÍNIMO DE QUATRO HORAS.

**Critérios de realização**

- Este exame NÃO é realizado com anestesia, pois requer colaboração do paciente.

- Não realizamos este exame em menores de 12 anos.

**Recomendações importantes:**

- Comparecer à Unidade sem joias, brincos e pulseiras. A retirada de piercings, se houver, será necessária.

- Estar com cabelos secos, sem uso de gel ou cremes

- Não usar óleos corporais ou cremes analgésicos no local do estudo.

- Clientes menores de 18 anos:

- ✓ Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento;

- Clientes acima de 70 anos:

- ✓ Necessário apresentar resultado de Creatinina realizado nos últimos 60 dias.

O resultado atual de Creatinina também é necessário para clientes que apresentam os seguintes quadros:

- ✓ Doença renal aguda ou crônica
- ✓ Realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias
- ✓ Diabéticos
- ✓ Hipertensão ou gota

- Clientes alérgicos a contraste ou alergia importante à medicamentos e/ou alimentos:

Entrar em contato com a Central de Atendimento para obter orientações

- Mulheres em período de amamentação

Recomenda-se por precaução, interromper a amamentação por 24h após o uso do contraste, para tanto, recomenda-se que seja ordenhado o leite antes do exame, para ser oferecido à criança neste período. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento para maiores informações.

- O cliente deve apresentar exames anteriores, se houver.

### **Preparo**

#### **Nas 48h que antecedem o exame:**

O cliente deve suspender o uso dos medicamentos sildenafil (Revatio e Viagra), tadalafila (Cialis) ou vardenafila (Levitra e Vivanza).

#### **Nas 24 horas que antecedem o exame:**

O cliente não deve ingerir produtos que apresentem cafeína e outras xantinas em sua composição, como café (mesmo o descafeinado), chás, chocolate, refrigerantes (mesmo bebidas levemente gaseificadas e água tônica), bebidas energéticas e alguns medicamentos. O consumo dessas substâncias inviabiliza a realização do exame.  
Não ingerir bebidas alcoólicas.

Não utilizar cremes, pomadas, loções ou óleos sobre a pele do tórax.

**No dia do exame:**

Fumantes precisam ficar sem fumar pelo menos três horas antes do exame e uma hora após seu término.

No dia do procedimento, não devem ser feitos exercícios físicos.

É necessário o jejum de quatro horas antes da realização do exame.

Preferencialmente, não vir com objetos metálicos (correntes, colares, gargantilhas, etc.).

Para homens, pode haver necessidade de realizar tricotomia (raspagem dos pêlos) em alguns pontos do tórax para permitir a fixação dos eletrodos.

- Caso tenha o hábito de tomar algum tipo de calmante, sedativo ou relaxante, poderá tomá-lo 1 hora antes do exame, na dosagem em que está habituado. Neste caso deverá comparecer ao exame acompanhado e não deverá dirigir (veículo automotivo).

**Contraindicações**

Os seguintes materiais são contraindicados para a realização do exame:

Marca-passo cardíaco  
Neuroestimulador  
Clipes de aneurisma  
Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata)  
Implantes otológicos cocleares  
Fixadores ortopédicos externos

	<p>b) Materiais permitidos para a realização do exame:</p> <p>Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar  Próteses valvares cardíacas (mesmo as metálicas)  Implantes ortopédicos, como próteses, pinos, parafusos e hastes (exceto os fixadores externos)  Derivação ventriculoperitoneal  Dispositivo intrauterino (DIU)  "Stents" intravasculares (como "stent" coronariano, por exemplo) são permitidos para a realização da ressonância somente após 6 semanas de sua colocação.</p> <p>c) Tatuagens e Maquiagem definitiva: esperar pelo menos 30 dias para realizar a RM;</p> <p>d) A RM deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 16 semanas). Caso haja dúvida em relação a possível gestação inicial, necessária confirmação com exame de beta-HCG sanguíneo.</p> <p>e) Portadores de clipe de aneurisma, próteses de ouvido ou expansor mamário, o exame só poderá ser realizado se comprovarem a marca e modelo de objeto utilizado, por meio de formulário, cartão de fabricante ou carta do médico informando a marca, modelo e ano de fabricação.</p> <p>Caso já tenha realizado RM após a colocação do objeto, trazer o laudo e imagens do dia do exame.</p>
<p>RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO</p>	<p><b>Instruções</b></p> <p>- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no</p>

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PARA  
AVALIAÇÃO DE FLUXO LIQUÓRICO

RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO  
(COM ESPECTROSCOPIA E/OU  
PERFUSÃO)

equipamento de ressonância magnética, o que é avaliado no momento do estudo, de acordo com a distribuição da gordura corporal e com a circunferência abdominal de cada pessoa. De qualquer modo, trata-se de um fator importante para os indivíduos com peso superior a **150 kg.**

- Este exame é realizado somente com solicitação médica.

- Pode ser feito com anestesia em crianças até 5 anos ou pessoas de qualquer idade que sabidamente tenham dificuldades em colaborar.

**Recomendações importantes:**

- Comparecer à Unidade sem joias, brincos ou pulseiras. A retirada de piercings, se houver, será necessária;

- Estar com cabelos secos, sem uso de gel ou cremes;

- Não usar óleos corporais ou cremes analgésicos no local do estudo.

- Clientes que utilizam aparelho ortodôntico móvel precisam retirá-lo antes do exame. Os fixos, embora possam prejudicar a qualidade do exame, não apresentam risco para o cliente. Porém, no caso de o aparelho fixo gerar artefatos que impedem a avaliação do exame, será informado ao paciente, que precisará retornar com seu médico para avaliar se há possibilidade de solicitar outro exame que não gere artefatos ou se, estritamente necessária a RM, que avalie a possibilidade da remoção do aparelho ortodôntico fixo antes do exame.

- Clientes menores de 18 anos:

- ✓ Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.

- Clientes acima de 70 anos:

- ✓ Necessário apresentar resultado de Creatinina realizado nos últimos 60 dias.

O resultado atual de Creatinina também é necessário para clientes que apresentam os seguintes quadros:

- ✓ - Doença renal aguda ou crônica
- ✓ - Realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias
- ✓ - Diabéticos
- ✓ - Hipertensão ou gota

Clientes alérgicos a contraste

- ✓ Entrar em contato com a Central de Atendimento para obter orientações

- Mulheres em período de amamentação

Recomenda-se por precaução, interromper a amamentação por 24h após o uso do contraste, para tanto, recomenda-se que seja ordenado o leite antes do exame, para ser oferecido à criança neste período. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento para maiores informações.

- O cliente deve apresentar exames anteriores, se houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a

realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

- Caso tenha o hábito de tomar algum tipo de calmante, sedativo ou relaxante, poderá tomá-lo 1 hora antes do exame, na dosagem em que está habituado. Porém, deverá comparecer à Clínica acompanhado e não deverá dirigir veículo automotivo após seu uso..

- No caso de antecedentes alérgicos, informe no momento do agendamento para que seja avaliada a necessidade do uso de contraste e possivelmente de preparo antialérgico.

### **Contraindicações**

**É PROIBIDA A ENTRADA NAS SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PORTANDO QUALQUER OBJETO METÁLICO NO CORPO (RELÓGIOS, CHAVES, BRINCOS, MOEDAS, CARTÃO MAGNÉTICO, ETC).**

**PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIAS NEUROLÓGICAS DEVEM APRESENTAR LAUDO MÉDICO INFORMANDO A MARCA E MODELO DO MATERIAL IMPLANTADO (POR EXEMPLO NO CASO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMAS) E INFORMANDO A COMPATIBILIDADE DO MATERIAL COM O CAMPO MAGNÉTICO DA RESSONÂNCIA.**

### **ATENÇÃO:**

**Em caso de conter materiais metálicos não descritos aqui, o cliente deve entrar em contato com a**

**MAGSCAN para verificar a possibilidade de realizar o exame.**

**a) Os seguintes materiais contra indicam a realização do exame:**

- ✓ Marca-passo cardíaco;
- ✓ Neuroestimulador;
- ✓ Clipes de aneurisma;
- ✓ Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata);
- ✓ Implantes otológicos cocleares;
- ✓ Fixadores ortopédicos externos;
- ✓ Acidente com arma de fogo: a depender do local. Informe para verificar a possibilidade de realizar o exame.

**b) Materiais permitidos para a realização do exame:**

- Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar;

- Próteses valvares cardíacas (mesmo as metálicas);

- Implantes ortopédicos, como próteses, pinos, parafusos e hastes (exceto os fixadores externos). Exceto se paciente inconsciente;

- Derivação ventriculoperitoneal;

- Dispositivo intrauterino (DIU);

- Stents intravasculares (como Stent coronariano, por exemplo) são permitidos para a realização da ressonância **somente após 6 semanas de sua colocação;**

**c) Tatuagens e Maquiagem definitiva: esperar pelo menos 30 dias para realizar a RM;**

**d) A RM deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas). Caso haja dúvida em relação à possível gestação inicial,**

	<p><b>necessária confirmação com exame de beta-HCG sanguíneo;</b></p> <p><b>e) Portadores de clipe de aneurisma, próteses de ouvido ou expansor mamário, o exame só poderá ser realizado se comprovarem a marca e modelo de objeto utilizado, por meio de formulário, cartão de fabricante ou carta do médico informando a marca, modelo e ano de fabricação, (caso já tenha realizado RM após a colocação do objeto, trazer o laudo e imagens do dia do exame).</b></p>
<p>RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA HIPÓFISE</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de ressonância magnética, o que é avaliado no momento do estudo, de acordo com a distribuição da gordura corporal e com a circunferência abdominal de cada pessoa. De qualquer modo, trata-se de um fator importante para os indivíduos com peso superior a 150 kg.</li> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica.</li> <li>- Pode ser feito com anestesia em menores de 5 anos de idade ou pessoas de qualquer idade que possuam dificuldades em colaborar.</li> </ul> <p><b>Recomendações importantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Comparecer à Unidade sem joias, brincos ou pulseiras. A retirada de piercings, se houver, será necessária;</li> <li>- Estar com cabelos secos, sem uso de gel ou cremes;</li> <li>- Não usar óleos corporais ou cremes analgésicos no local do estudo.</li> </ul>

- Clientes que utilizam aparelho ortodôntico móvel precisam retirá-lo antes do exame. Os fixos, embora possam prejudicar a qualidade do exame, não apresenta risco para o cliente. Porém, no caso de o aparelho fixo gerar artefatos que impedem a avaliação do exame, será informado ao paciente, que precisará retornar com seu médico para avaliar se há possibilidade de solicitar outro exame que não gere artefatos ou se, estritamente necessária a RM, que avalie a possibilidade da remoção do aparelho ortodôntico fixo antes do exame.

- Clientes menores de 18 anos:

- ✓ Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.

- Clientes acima de 70 anos:

- ✓ Necessário apresentar resultado de Creatinina realizado nos últimos 60 dias.

O resultado atual de Creatinina também é necessário para clientes que apresentam os seguintes quadros:

- ✓ - Doença renal aguda ou crônica
- ✓ - Realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias
- ✓ - Diabéticos
- ✓ - Hipertensão ou gota

Clientes alérgicos a contraste

- ✓ Entrar em contato com a Central de Atendimento para obter orientações.

- Mulheres em período de amamentação:

Recomenda-se por precaução, interromper a amamentação por 24h após o uso do contraste, para tanto, recomenda-se que seja ordenado o leite antes do exame, para ser oferecido à criança neste período. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento para maiores informações.

- O cliente deve apresentar exames anteriores, se houver, **INCLUSIVE RESULTADOS HORMONAIS: PROLACTINA;**

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

- Caso tenha o hábito de tomar algum tipo de calmante, sedativo ou relaxante, poderá tomá-lo 1 hora antes do exame, na dosagem em que está habituado. Porém, deverá comparecer à Clínica acompanhado e não deverá dirigir veículo automotivo após seu uso..

- No caso de antecedentes alérgicos, informe no momento do agendamento para que seja avaliada a necessidade do uso de contraste e possivelmente de preparo antialérgico.

### **Contraindicações**

**É PROIBIDA A ENTRADA NAS SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PORTANDO QUALQUER OBJETO METÁLICO NO**

**CORPO (RELÓGIOS, CHAVES, BRINCOS, MOEDAS, CARTÃO MAGNÉTICO, ETC).**

**PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIAS NEUROLÓGICAS DEVEM APRESENTAR LAUDO MÉDICO INFORMANDO A MARCA E MODELO DO MATERIAL IMPLANTADO (POR EXEMPLO NO CASO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMAS) E INFORMANDO A COMPATIBILIDADE DO MATERIAL COM O CAMPO MAGNÉTICO DA RESSONÂNCIA.**

**ATENÇÃO:**

**Em caso de conter materiais metálicos não descritos aqui, o cliente deve entrar em contato com a MAGSCAN para verificar a possibilidade de realizar o exame.**

**a) Os seguintes materiais contra indicam a realização do exame:**

- ✓ Marca-passo cardíaco;
- ✓ Neuroestimulador;
- ✓ Clipes de aneurisma;
- ✓ Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata);
- ✓ Implantes otológicos cocleares;
- ✓ Fixadores ortopédicos externos;
- ✓ Acidente com arma de fogo: a depender do local. Informe para verificar a possibilidade de realizar o exame.

**b) Materiais permitidos para a realização do exame:**

- Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar;
- Próteses valvares cardíacas (mesmo as metálicas);

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Implantes ortopédicos, como próteses, pinos, parafusos e hastes (exceto os fixadores externos). Exceto de paciente inconsciente.</li> <li>- Derivação ventriculoperitoneal</li> <li>- Dispositivo intrauterino (DIU)</li> <li>- Stents intravasculares (como Stent coronariano, por exemplo) são permitidos para a realização da ressonância <b>somente após 6 semanas de sua colocação.</b></li> </ul> <p><b>c) Tatuagens e Maquiagem definitiva: esperar pelo menos 30 dias para realizar a RM.</b></p> <p><b>d) A RM deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas). Caso haja dúvida em relação a possível gestação inicial, necessário confirmação com exame de beta-HCG sanguíneo.</b></p> <p><b>e) Portadores de clipe de aneurisma, próteses de ouvido ou expansor mamário, o exame só poderá ser realizado se comprovarem a marca e modelo de objeto utilizado, por meio de formulário, cartão de fabricante ou carta do médico informando a marca, modelo e ano de fabricação, (caso já tenha realizado RM após a colocação do objeto, trazer o laudo e imagens do dia do exame);</b></p>
<p style="text-align: center;">RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DAS ÓRBITAS</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de ressonância magnética, o que é avaliado no momento do estudo, de acordo com a distribuição da gordura corporal e com a circunferência abdominal de cada</li> </ul>

pessoa. De qualquer modo, trata-se de um fator importante para os indivíduos com peso superior a 150 kg.

- Este exame é realizado somente com solicitação médica.

- Pode ser feito com anestesia. Sendo obrigatória para menores de 5 anos de idade ou pessoas de qualquer idade que possuam dificuldades em colaborar.

**Recomendações importantes:**

- Não usar maquiagem no rosto e área dos olhos, em especial uso de rímel, cílios postiços, sombra ou lápis de olho. Os pigmentos destes produtos geralmente causam artefatos e prejudicam a qualidade do exame.

- Retirar lentes antes do exame.

- Comparecer à Unidade sem joias, brincos ou pulseiras. A retirada de piercings, se houver, será necessária;

- Estar com cabelos secos, sem uso de gel ou cremes;

- Não usar óleos corporais ou cremes analgésicos no local do estudo.

- Clientes que utilizam aparelho ortodôntico móvel precisam retirá-lo antes do exame. Os fixos, embora possam prejudicar a qualidade do exame, não apresentam risco para o cliente. Porém, no caso de o aparelho fixo gerar artefatos que impedem a avaliação do exame, será informado ao paciente, que precisará retornar com seu médico para avaliar se há possibilidade de solicitar outro exame que não gere artefatos ou se, estritamente necessária a RM, que avalie a possibilidade da remoção do

aparelho ortodôntico fixo antes do exame.

- Clientes menores de 18 anos:

- ✓ Devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.

- Clientes acima de 70 anos:

- ✓ Necessário apresentar resultado de Creatinina realizado nos últimos 60 dias.

O resultado atual de Creatinina também é necessário para clientes que apresentam os seguintes quadros:

- ✓ - Doença renal aguda ou crônica
- ✓ - Realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias
- ✓ - Diabéticos
- ✓ - Hipertensão ou gota

Clientes alérgicos a contraste

- ✓ Entrar em contato com a Central de Atendimento para obter orientações

- Mulheres em período de amamentação

Recomenda-se por precaução, interromper a amamentação por 24h após o uso do contraste, para tanto, recomenda-se que seja ordenado o leite antes do exame, para ser oferecido à criança neste período. Em caso de dúvidas, entrar em contato com a Central de Atendimento para maiores informações.

- O cliente deve apresentar exames anteriores, se houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas

unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

- Caso tenha o hábito de tomar algum tipo de calmante, sedativo ou relaxante, poderá tomá-lo 1 hora antes do exame, na dosagem em que está habituado. Porém, deverá comparecer à Clínica acompanhado e não deverá dirigir veículo automotivo após seu uso.

- No caso de antecedentes alérgicos, informe no momento do agendamento para que seja avaliada a necessidade do uso de contraste e possivelmente de preparo antialérgico.

### **Contraindicações**

**É PROIBIDA A ENTRADA NAS SALAS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PORTANDO QUALQUER OBJETO METÁLICO NO CORPO (RELÓGIOS, CHAVES, BRINCOS, MOEDAS, CARTÃO MAGNÉTICO, ETC).**

**PACIENTES SUBMETIDOS À CIRURGIAS NEUROLÓGICAS DEVEM APRESENTAR LAUDO MÉDICO INFORMANDO A MARCA E MODELO DO MATERIAL IMPLANTADO (POR EXEMPLO NO CASO DE EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMAS) E INFORMANDO A COMPATIBILIDADE DO MATERIAL COM O CAMPO MAGNÉTICO DA RESSONÂNCIA.**

**ATENÇÃO:**

**Em caso de conter materiais metálicos não descritos aqui, o cliente deve entrar em contato com a MAGSCAN para verificar a possibilidade de realizar o exame.**

**a) Os seguintes materiais contra indicam a realização do exame:**

- ✓ Marca-passo cardíaco;
- ✓ Neuroestimulador;
- ✓ Clipes de aneurisma;
- ✓ Implantes e aparelhos oculares (exceto lentes intraoculares para catarata);
- ✓ Implantes otológicos cocleares;
- ✓ Fixadores ortopédicos externos;
- ✓ Acidente com arma de fogo: a depender do local. Informe para verificar a possibilidade de realizar o exame.

**b) Materiais permitidos para a realização do exame:**

- Clipes utilizados em cirurgias de vesícula biliar;
- Próteses valvares cardíacas (mesmo as metálicas);
- Implantes ortopédicos, como próteses, pinos, parafusos e hastes (exceto os fixadores externos). Exceto de paciente inconsciente.
- Derivação ventriculoperitoneal
- Dispositivo intrauterino (DIU)
- Stents intravasculares (como Stent coronariano, por exemplo) são permitidos para a realização da ressonância **somente após 6 semanas de sua colocação.**

**c) Tatuagens e Maquiagem definitiva: esperar pelo menos 30 dias para realizar a RM.**

	<p>d) A RM deve ser evitada no primeiro trimestre de gestação (até 12 semanas). Caso haja dúvida em relação a possível gestação inicial, necessário confirmação com exame de beta-HCG sanguíneo.</p> <p>e) Portadores de clipe de aneurisma, próteses de ouvido ou expansor mamário, o exame só poderá ser realizado se comprovarem a marca e modelo de objeto utilizado, por meio de formulário, cartão de fabricante ou carta do médico informando a marca, modelo e ano de fabricação, (caso já tenha realizado RM após a colocação do objeto, trazer o laudo e imagens do dia do exame).</p>
--	--

#### EXAMES RADIOLÓGICOS – RX CONTRASTADO

<p>HISTEROSSALPINGOGRAFIA</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame deve ser <b>agendado com antecedência</b>.</li> <li>- Este exame utiliza contraste iodado. Deve-se preencher o questionário de segurança para exames com contraste.</li> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica. Pode-se encaminhar o pedido médico pelo Whatsapp (para verificação de data e informações).</li> <li>- Procedimentos <b>*com sedação*</b> devem ser agendados no dia em que é organizada a agenda de anestesia.</li> <li>- É necessário encaminhar com antecedência um exame <b>preventivo recente</b> (colpocitologia oncótica), com</li> </ul>
-------------------------------	--

data de validade de pelo menos 06 meses antes da realização deste exame;

- Caso haja alterações ou sinais de infecção no preventivo apresentado, a paciente deve passar em uma consulta com o médico ginecologista para solicitar uma avaliação ginecológica, tratar possível infecção e o ginecologista deve elaborar um relatório informando se a paciente está apta ou não (expor o parecer).

- Na **suspeita de infecção do trato genital recente** (ex: corrimento vaginal, prurido (coceira), irritação cutânea na região íntima, odor íntimo desagradável) este exame não poderá ser realizado. Converse com seu médico para avaliar a necessidade de um tratamento antes da realização deste exame.

- Informar se o ciclo menstrual é regular ou irregular .

- **Informar para o agendamento qual foi o primeiro dia do último ciclo menstrual** (o dia que desceu o sangramento).

- **A histerossalpingografia só pode ser feita entre o 6º e o 12º dia do ciclo menstrual, isto é, após o início da menstruação.** (Verificar a disponibilidade da agenda).

- Caso a cliente informe que **não menstrua regularmente** o exame poderá ser realizado em qualquer data mediante apresentação de teste de gravidez (Bhcg recente – pelo menos 02 dias antes do dia do exame).

- **Se houver suspeita de gravidez**, a cliente **não** poderá realizar o exame.

- Menores de 18 anos devem estar acompanhadas de um responsável legal.

- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica, é de 130 kg.

- É comum pequeno sangramento vaginal após o exame: Recomenda-se trazer absorvente higiênico e material de higiene pessoal que julgar necessário no dia da realização do exame.

**- No caso de exame realizado com anestesia, seguir recomendações de exames com anestesia.**

#### **Informações Básicas:**

Exame deve ser feito entre o 6 e o 12 dia do ciclo menstrual (1º dia do ciclo = 1º dia da Menstruação), isto é, após o início da menstruação;

Paciente não pode estar grávida, com suspeita de gravidez ou atraso menstrual - caso haja suspeita, trazer exame BHCG negativo - recente de um a dois dias;

Paciente não deve apresentar corrimento – Papanicolau (preventivo) recente sem sinais de infecção;

Pacientes com alergia grave ao contraste iodado ou a medicamentos que contém iodo **não** poderão realizar este exame. Paciente deve informar qualquer alergia prévia, sendo avaliado pelo médico da Clínica cada caso.

Pacientes que possuem DIU **não** poderão realizar este exame;

Pacientes com cirurgias prévias de Abdômen/Pelve, exemplo: Laqueadura, Ooforectomia podem realizar o exame, desde que o procedimento cirúrgico

tenha ocorrido há, pelo menos, mais de 01 mês..

Paciente deve vir com acompanhante maior de idade;

Dois dias antes e dois dias após a realização deste exame, a paciente **não** poderá realizar exames de **Tomografia Computadorizada ou Urografia Excretora.**

#### **Preparo para o procedimento:**

Paciente deve vir acompanhada e sem esmaltes nas unhas.

#### DIA ANTERIOR DO EXAME

- ✓ Se a paciente for portadora de alguma doença ou alergia deve entrar em contato conosco para comunicar, antes que o exame seja realizado;
- ✓ Não manter relações sexuais;
- ✓ No período da tarde, tomar 2 comprimidos de laxante (Dulcolax ou outro de sua preferência), depois deve beber bastante líquidos, suco de laranja e ameixa. Fazer dieta leve (sem carnes, massas ou pão).

#### NO DIA DO EXAME

- ✓ Jejum de 6h antes do horário marcado do exame.
- ✓ 1 hora antes do exame, tomar 1 comprimido de Buscopan Composto, caso não seja alérgico aos componentes (buscopan, dipirona);
- ✓ Trazer um absorvente íntimo.
- ✓ Não manter relações sexuais;

#### APÓS O EXAME

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tomar 1 comprimido de Buscopan Composto, caso não seja alérgico aos componentes (buscopan, dipirona);</li> <li>✓ Fazer repouso de 8 h;</li> <li>✓ Em caso de dor, tomar IBUPROFENO - 600mg, 1 comprimido por via oral de 8 em 8 horas, no máximo por 2 dias (informar ao médico caso não possa usar esta medicação, caso seja alérgico, para orientações).</li> <li>✓ Não manter relações sexuais por 02 dias;</li> <li>✓ Em caso de dor abdominal intensa, febre, calafrios ou sangramento volumoso, deve-se procurar auxílio médico ( pronto atendimento) imediatamente.</li> </ul>
<p>RADIOGRAFIAS DIGITAIS DE ESÔFAGO CONTRASTADO</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- Este exame utiliza contraste baritado e em alguns casos, contraste iodado.</li> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica.</li> <li>- Este exame não é realizado em gestantes, salvo em situações nas quais ele seja absolutamente necessário. Neste caso, é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para consultar os médicos responsáveis.</li> <li>- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.</li> <li>- O cliente deve apresentar exames anteriores relacionados com o aparelho digestivo, se houver (radiografias, endoscopias, tomografias, ressonância, laudos de cirurgias se tiver, etc.).</li> <li>- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica é de 130kg;</li> </ul>

	<p>- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.</p> <p><b>Preparo</b></p> <p>-Jejum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Até 1 ano: jejum absoluto (inclusive de água) de três horas;</li> <li>✓ De 1 a 4 anos: jejum absoluto (inclusive de água) de quatro horas;</li> <li>✓ Acima de 4 anos: jejum absoluto (inclusive de água) seis horas.</li> </ul> <p>- Crianças devem usar roupas sem botões e os pais ou responsáveis devem levar duas mamadeiras vazias para que a criança possa tomar o contraste. As mamadeiras precisam ter bicos para leite, no caso de bebês com menos de 6 meses, e bicos para leite e para líquido espesso, no caso de crianças com mais de 6 meses.</p> <p>- Para crianças em aleitamento materno exclusivo, a mãe deve retirar o leite com bombinha (de 200 a 240 ml) e trazer à MAGSCAN numa mamadeira, em recipiente térmico no dia da realização do exame.</p> <p>- Para crianças que não tomam leite de vaca, a mãe pode trazer leite de soja, leite especial ou suco de sua preferência.</p> <p>- Fumantes não podem fumar no dia da radiografia.</p>
<p>RADIOGRAFIAS DIGITAIS DO ESÔFAGO, ESTÔMAGO E DUODENO</p>	<p><b>Instruções</b></p> <p>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</p>

- Este exame utiliza contraste baritado e em alguns casos, contraste iodado.

.

- Este exame é realizado somente com solicitação médica.

- Este exame não é realizado em gestantes, salvo em situações nas quais ele seja absolutamente necessário. Neste caso, é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para consultar os médicos responsáveis.

- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.

- O cliente deve apresentar exames anteriores relacionados com o aparelho digestivo, se houver (radiografias, endoscopias, tomografias, ressonância, laudos de cirurgias se tiver, etc.).

- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica é de 130kg;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

-Jejum

Até 1 ano: jejum absoluto (inclusive de água) de três horas;

De 1 a 4 anos: jejum absoluto (inclusive de água) de quatro horas;

	<p>Acima de 4 anos: jejum absoluto (inclusive de água) seis horas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Crianças devem usar roupas sem botões e os pais ou responsáveis devem levar duas mamadeiras vazias para que a criança possa tomar o contraste. As mamadeiras precisam ter bicos para leite, no caso de bebês com menos de 6 meses, e bicos para leite e para líquido espesso, no caso de crianças com mais de 6 meses.</li> <li>- Para crianças em aleitamento materno exclusivo, a mãe deve retirar o leite com bombinha (de 200 a 240 ml) e trazer à MAGSCAN numa mamadeira, em recipiente térmico no dia da realização do exame.</li> <li>- Para crianças que não tomam leite de vaca, a mãe pode trazer leite de soja, leite especial ou suco de sua preferência.</li> <li>- Fumantes não podem fumar no dia da radiografia.</li> <li>- Tomar medicações de uso diário normalmente.</li> </ul>
<p>RADIOGRAFIAS DIGITAIS DO TRÂNSITO E MORFOLOGIA DO INTESTINO DELGADO</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica.</li> <li>- Este exame utiliza contraste baritado e em alguns casos, contraste iodado.</li> <li>- A primeira fase dura cerca de quatro horas, mas a presença do cliente pode ser novamente requerida após esse período, no mesmo dia.</li> <li>- Pode ser necessário que o cliente deva retornar à MAGSCAN para completar o exame no dia seguinte, no mesmo horário do primeiro dia, por um período de 30 minutos. Se isso for necessário será informado ao cliente mediante avaliação das imagens feitas no primeiro dia.</li> </ul>

- Este exame não é realizado em gestantes, salvo em situações nas quais ele seja absolutamente necessário. Neste caso, é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para consultar os médicos responsáveis.

- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.

- O cliente deve apresentar ( se houver) exames de imagem realizados anteriormente, tais como raios X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, mapeamento com radioisótopos e endoscopias.

- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

#### **Jejum**

- ✓ Até 13 anos: jejum absoluto (inclusive de água) de três
- ✓ Acima de 13 anos: jejum absoluto (inclusive de água) seis horas.

ENEMA OPACO, ADULTO (DUPLO  
CONTRASTE COM PREPARO)

- **Estas orientações devem ser seguidas por pacientes maiores que 12 anos e adultos, que não usam bolsa de colostomia.**

### **Instruções**

-Este exame deve ser agendado com antecedência.

- Este exame utiliza contraste baritado e em alguns casos, contraste iodado.

- O tempo de permanência na MAGSCAN é de cerca de cinco horas.

- Este exame **não** é realizado em gestantes.

- O cliente deve apresentar exames de imagem realizados anteriormente, tais como raios X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, mapeamento com radioisótopos e endoscopias.

- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;

- Menores de 18 anos, devem comparecer à unidade acompanhados de um responsável legal;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

Na antevéspera do exame

(exemplo: se exame será realizado na segunda, antevéspera seria no sábado, ou seja, dois dias antes);

Na hora do jantar, o cliente deve fazer uma dieta leve, sem resíduos e com pouca gordura. Os alimentos permitidos são:

- ✓ Suco de fruta (coado), água ou chá;
- ✓ Biscoito água e sal;
- ✓ Gelatina (sem pedaços de frutas);
- ✓ Sopa de caldo de carne magra, coada, podendo conter legumes batidos no liquidificador ou passados na peneira;
- ✓ Ovos quentes ou cozidos;
- ✓ PROIBIDO PARA O EXAME: leite e derivados.

Às 20 horas, o cliente deve tomar 20 (vinte) gotas do laxante Guttalax com um pouco de água.

Na véspera do exame

(exemplo: se o exame será realizado na segunda, véspera seria no domingo, ou seja, um dia antes);

Às 8 horas, é necessário tomar novamente 20 (vinte) gotas do laxante Guttalax com um pouco de água, e repetir a dose do medicamento entre 14 e 16 horas.

Durante todo o dia, o cliente deve manter a dieta descrita acima e ingerir bastante líquido.

No dia do exame

	<p>É permitido o consumo de líquidos (água, chá ou suco de fruta coado) no máximo até duas horas antes do horário marcado para o exame.</p> <p>Duas horas antes do horário marcado para o exame o cliente deve aplicar por via retal uma bisnaga de Minilax (supositório).</p> <p><b>Observação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O laxante Guttalax e o supositório Minilax podem ser adquiridos em farmácias.</li> <li>- No dia do exame, será realizada uma radiografia sem contraste do abdômen para confirmar a presença de mínima quantidade de resíduos fecais. Alguns pacientes podem necessitar de mais um dia de preparo para adequada limpeza do cólon (intestino grosso).</li> <li>- No dia do exame recomenda-se trazer consigo material de higiene pessoal que julgar necessário (toalha, sabonete, etc), inclusive fraldas extras no caso de crianças e idosos que necessitam.</li> </ul>
<p>ENEMA OPACO, CRIANÇAS DE 05 ANOS ATÉ 12 ANOS (DUPLO CONTRASTE COM PREPARO)</p>	<p><b>Estas orientações devem ser seguidas por pacientes crianças entre 5 e 12 anos, que não usam bolsa de colostomia.</b></p> <p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Este exame deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- Este exame utiliza contraste baritado e em alguns casos, contraste iodado.</li> <li>- O tempo de permanência na MAGSCAN é de cerca de cinco horas.</li> </ul>

- O cliente deve apresentar exames de imagem realizados anteriormente, tais como raios X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, mapeamento com radioisótopos e endoscopias.

- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;

- Pacientes devem comparecer à unidade acompanhados de um responsável legal;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

Na antevéspera do exame (exemplo: se exame será realizado na segunda, antevéspera seria no sábado, ou seja, dois dias antes);

- Tomar 12 gotas de Dimeticona (Flagass) de 6/6horas a partir do café da manhã;

O cliente deve fazer uma dieta leve, sem resíduos e com pouca gordura. Os alimentos permitidos são:

- ✓ Suco de fruta (coado), água ou chá;
- ✓ Biscoito água e sal;
- ✓ Gelatina (sem pedaços de frutas);

- ✓ Sopa de caldo de carne magra, cozida, podendo conter legumes batidos no liquidificador ou passados na peneira;
- ✓ Ovos quentes ou cozidos;
- ✓ PROIBIDO PARA O EXAME: leite e derivados.

Na véspera do exame (exemplo: se o exame será realizado na segunda, véspera seria no domingo, ou seja, um dia antes);

- Tomar 12 gotas de Dimeticona (Flagass) de 6/6horas a partir do café da manhã;

- Antes das 8 horas da manhã, a criança deve receber 10 (dez) gotas do laxante Guttalax® com um pouco de água. Essa dose deve ser repetida entre 14 e 16 horas.

O cliente deve fazer uma dieta leve, sem resíduos e com pouca gordura. Os alimentos permitidos são:

- ✓ Suco de fruta (coado), água ou chá (beber bastante líquidos).
- ✓ Biscoito água e sal;
- ✓ Gelatina (sem pedaços de frutas);
- ✓ Sopa de caldo de carne magra, coada, podendo conter legumes batidos no liquidificador ou passados na peneira;
- ✓ Ovos quentes ou cozidos;
- ✓ PROIBIDO PARA O EXAME: leite e derivados.

No dia do exame

Jejum absoluto.

**Observação**

	<p>- No dia do exame recomenda-se trazer consigo material de higiene pessoal que julgar necessário (toalha, sabonete, etc), inclusive fraldas extras no caso de crianças e idosos que necessitam.</p> <p>- No dia anterior ao exame, os medicamentos em comprimido e cápsulas devem ser triturados antes de serem ingeridos, mantendo os mesmos horários habituais.</p>
<p>ENEMA OPACO, CRIANÇAS ATÉ 05 ANOS (CONTRASTE SIMPLES SEM</p>	<p><b>Estas orientações devem ser seguidas por pacientes crianças, até 05 anos, em investigação de constipação/prisão de ventre, suspeita de megacólon.</b></p> <p>* No caso de crianças menores de 5 anos, em investigação de sangramento retal, sangramento nas fezes e/ou suspeita de pólipos é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para consultar os médicos responsáveis sobre o preparo antes da realização deste Exame.</p> <p><b>Instruções</b></p> <p>-Este exame deve ser agendado com antecedência.</p> <p>- - Este exame utiliza contraste baritado e em alguns casos, contraste iodado.</p> <p>- O tempo de permanência na MAGSCAN é de cerca de três horas.</p> <p>- O cliente deve apresentar exames de imagem realizados anteriormente, tais como raios X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, mapeamento com radioisótopos e endoscopias.</p> <p>- Paciente deve ser acompanhada de um responsável legal;</p>

	<p>- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.</p> <p><b>Preparo</b></p> <p>Não deve ser feito nenhum preparo.</p>
<p>ENEMA OPACO, ADULTO COM BOLSA DE COLOSTOMIA (CONTRASTE SIMPLES)</p>	<p><b>Estas orientações devem ser seguidas por pacientes crianças maiores que 12 anos e adultos, que não usam bolsa de colostomia.</b></p> <p><b>Instruções</b></p> <p>-Este exame deve ser agendado com antecedência.</p> <p>- Este exame utiliza contraste.</p> <p>- O tempo de permanência na MAGSCAN é de cerca de cinco horas.</p> <p>- Este exame não é realizado em gestantes.</p> <p>- O cliente deve apresentar exames de imagem realizados anteriormente, tais como raios X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, mapeamento com radioisótopos e endoscopias.</p> <p>- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;</p>

- Menores de 18 anos, devem comparecer à unidade acompanhados de um responsável legal;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

#### *Na antevéspera do exame*

(exemplo: se exame será realizado na segunda, antevéspera seria no sábado, ou seja, dois dias antes);

- Tomar 3 comprimidos de Dimeticona (Luftal, Flagass) de 6/6horas a partir do café da manhã;

- Ingerir 3 ou mais litros de água ou sucos de frutas coados;

O cliente deve fazer uma dieta leve, sem resíduos (alimentos coados) e com pouca gordura. Os alimentos permitidos são:

- ✓ Suco de fruta (coado), água ou chá;
- ✓ Biscoito água e sal;
- ✓ Gelatina (sem pedaços de frutas);
- ✓ Sopa de caldo de carne magra, coada, podendo conter legumes batidos no liquidificador ou passados na peneira;
- ✓ Ovos quentes ou cozidos;

- ✓ PROIBIDO PARA O EXAME: leite e derivados.

Na véspera do exame

(exemplo: se o exame será realizado na segunda, véspera seria no domingo, ou seja, um dia antes);

- Tomar 3 comprimidos de Dimeticona (Luftal, Flagass) de 6/6horas a partir do café da manhã;

- Ingerir 3 ou mais litros de água ou sucos de frutas coados;

O cliente deve fazer uma dieta leve, sem resíduos (alimentos coados) e com pouca gordura. Os alimentos permitidos são:

- ✓ Suco de fruta (coado), água ou chá;
- ✓ Biscoito água e sal;
- ✓ Gelatina (sem pedaços de frutas);
- ✓ Sopa de caldo de carne magra, coada, podendo conter legumes batidos no liquidificador ou passados na peneira;
- ✓ Ovos quentes ou cozidos;
- ✓ PROIBIDO PARA O EXAME: leite e derivados.

- Jantar às 20h e após, jejum absoluto para alimentos sólidos;

- Jejum absoluto para líquidos após a meia-noite.

- Os medicamentos em comprimido e cápsulas devem ser triturados antes de serem ingeridos, mantendo os mesmos horários habituais.

No dia do exame

- Jejum absoluto.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trazer uma bolsa extra de colostomia.</li> <li>- Trazer material de higiene pessoal.</li> </ul> <p><b>Observação</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- No dia do exame, será realizada uma radiografia sem contraste do abdômen para confirmar a presença de mínima quantidade de resíduos fecais. Alguns pacientes podem necessitar de mais um dia de preparo para adequada limpeza do cólon (intestino grosso).</li> <li>- No dia do exame recomenda-se trazer consigo material de higiene pessoal que julgar necessário (toalha, sabonete, etc), inclusive fraldas extras no caso de crianças e idosos que necessitam.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">URETROCISTOGRAFIA DIGITAL FEMININA</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- Este exame utiliza contraste iodado. Deve-se preencher o questionário de segurança para exames com contraste.</li> <li>- Exame realizado somente com solicitação médica.</li> <li>- Este exame não é realizado com sedação.</li> <li>- Este exame não é realizado em gestantes e mulheres que estejam amamentando, salvo em situações nas quais ele seja absolutamente necessário. Neste caso, é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para consultar os médicos responsáveis.</li> <li>- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.</li> <li>- Devem ser apresentados resultados de exames anteriores, se houver.</li> <li>- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;</li> </ul>

	<p>- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.</p> <p><b>Preparo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame não necessita de preparo.</li> <li>- Recomenda-se que o paciente apare os pelos da região genital.</li> </ul> <p><b>Importante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exame é contraindicado na vigência de infecção do trato urinário atual. Para agendamento deve-se encaminhar exame de urina recente (EAS), com data de realização/coleta de , no máximo, uma semana antes da data marcada para o exame.</li> <li>- No dia do exame recomenda-se trazer consigo material de higiene pessoal que julgar necessário (toalha, sabonete, etc), inclusive fraldas extras no caso de crianças e idosos que necessitam.</li> </ul>
<p style="text-align: center;">URETROCISTOGRAFIA DIGITAL MASCULINA</p>	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- Este exame utiliza contraste iodado. Deve-se preencher o questionário de segurança para exames com contraste.</li> <li>- Exame realizado somente com solicitação médica.</li> <li>- Este exame não é realizado com sedação.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal.</li> <li>- Devem ser apresentados resultados de exames anteriores, se houver.</li> <li>- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;</li> <li>- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.</li> </ul> <p><b>Preparo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame não necessita de preparo.</li> <li>- Recomenda-se que o paciente apare os pelos da região genital.</li> </ul> <p><b>Importante:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exame é contraindicado na vigência de infecção do trato urinário atual. Para agendamento deve-se encaminhar exame de urina recente (EAS), com data de realização de no máximo uma semana antes da data marcada para o exame.</li> </ul> <p>- No dia do exame recomenda-se trazer consigo material de higiene pessoal que julgar necessário (toalha, sabonete, etc), inclusive fraldas extras no caso de crianças e idosos que necessitam.</p>
UROGRAFIA EXCRETORA DIGITAL	<b>Instruções</b>

- Este exame utiliza contraste iodado. Deve-se preencher o questionário de segurança para exames com contraste.

- Deve ser agendado **sempre** com a presença do médico anestesista para acompanhamento.

- O procedimento leva 60 minutos, em média, podendo ter uma duração maior, dependendo de seu transcorrer.

- Exame realizado somente com solicitação médica.

- Este exame não é realizado em gestantes.

- Para clientes que estejam amamentando, poderá ser necessária a interrupção temporária da amamentação, por um período de 24 à 48 horas. Neste caso, deverá ser feito contato com médico do setor para esclarecimentos complementares.

- O cliente deve apresentar exames de imagem realizados anteriormente, tais como raios X, ultrassonografia, tomografia, ressonância magnética, mapeamento com radioisótopos.

- Menores de 18 anos devem fazer o exame acompanhados de um responsável legal.

- O limite de peso nos equipamentos de Raios-X, desta Clínica, é de 130kg;

#### **Suspensão de medicamentos**

O cliente deve suspender, nas 48 horas que antecedem o exame e com o consentimento do médico assistente, o uso de medicamentos que contenham a metformina (Dimefor, Glifage, Glucoformin, Glucovance ou Starform) e a fenformina (Debei),

que é contraindicado nos exames com contraste iodado endovenoso. A suspensão dessas medicações ainda precisa ser mantida por 48 horas após o exame.

### **Preparo**

Para crianças de até 1 ano de idade:

É necessário jejum absoluto (inclusive de água) de 3 horas.

Para crianças de 1 a 2 anos:

Deve ser agendado com anestesista.

Na véspera do exame:

- ✓ Antes das 8 horas da manhã, a criança tem de receber 5 (cinco) gotas do laxante Guttalax com um pouco de água. Essa dose deve ser repetida entre 14 e 16 horas.
- ✓ Durante todo o dia, a criança deve tomar bastante líquido e fazer uma dieta leve, sem resíduos e com pouca gordura. Recomenda-se o consumo de:
  - o Suco de fruta (coado), água ou chá;
  - o Biscoito de água e sal;
  - o Gelatina sem pedaços de frutas;
  - o Sopa de caldo de carne magra, coada, podendo conter legumes batidos no liquidificador ou passados na peneira;

- o Ovos quentes ou cozidos.
- o PROIBIDO PARA O EXAME: leite e derivados.

No dia do exame:

- ✓ É necessário jejum absoluto (inclusive de água) de 4 horas.
- ✓ Se a urografia for marcada para o período da tarde, a criança deve manter a dieta leve, acima descrita, até quatro horas antes do exame.

Para crianças 2 a 13 anos:

Na véspera do exame:

- ✓ - Antes das 8 horas da manhã, a criança deve receber 10 (dez) gotas do laxante Guttalax com um pouco de água. Essa dose deve ser repetida entre 14 e 16 horas
- ✓ - Durante todo o dia, a criança deve fazer dieta leve, sem resíduos e com pouca gordura. Recomenda-se o consumo de:
  - o Suco de fruta (coado), água ou chá;
  - o Biscoito de água e sal;
  - o Gelatina sem pedaços de frutas;
  - o Sopa de caldo de carne magra, coada, podendo conter legumes batidos no liquidificador ou

- passados na peneira;
- o Ovos quentes ou cozidos.
- o PROIBIDO PARA O EXAME: leite e derivados.

No dia do exame:

- ✓ É necessário jejum absoluto (inclusive de água) de 4 horas.
- ✓ Se a urografia for marcada para o período da tarde, a criança deve manter a dieta leve, acima descrita, até quatro horas antes do exame.

Maiores de 13 anos e adultos:

Na antevéspera do exame:

- ✓ No jantar, o cliente deve fazer dieta leve, sem resíduos e com pouca gordura. Recomenda-se o consumo de:
  - o Suco de fruta (coado), água ou chá;
  - o Biscoito de água e sal;
  - o Gelatina sem pedaços de frutas;
  - o Sopa de caldo de carne magra, coada, podendo conter legumes batidos no liquidificador ou passados na peneira;
  - o Ovos quentes ou cozidos.
  - o PROIBIDO PARA O EXAME: leite e derivados.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Às 20 horas, o cliente deve tomar 20 (vinte) gotas do laxante Guttalax com um pouco de água.</li> </ul> <p>Na véspera do exame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Às 8 horas da manhã, mais uma vez o cliente precisa tomar 20 (vinte) gotas do laxante Guttalax com um pouco de água. Essa dose deve ser repetida entre 14 e 16 horas.</li> <li>✓ Durante todo o dia o cliente precisa manter a dieta leve e com pouca gordura descrita acima.</li> </ul> <p>No dia do exame:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ É necessário jejum absoluto (inclusive de água) de 4 horas.</li> <li>✓ Se a urografia for marcada para o período da tarde, a dieta leve descrita anteriormente deve ser mantida até quatro horas antes do exame.</li> </ul> <p><b>Observação</b></p> <p>- O laxante Guttalax pode ser adquirido em farmácias.</p>
MAMOGRAFIA	<p><b>Instruções</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exame realizado por ordem de chegada de segunda a sexta-feira de 8h as 12h, de 14h as 16h30. Aos sábados de 8h as 11h.</li> <li>- No dia do exame, não usar talco, desodorante ou creme nas mamas ou na região das axilas.</li> </ul>

- No caso de pacientes no menacme (pacientes que ainda menstruam), de preferência, recomenda-se marcar a mamografia do 5º ao 10º dia do ciclo menstrual (contando-se a partir do primeiro dia da menstruação), pois as mamas geralmente estão menos dolorosas nesse intervalo, ou marcar em período determinado pelo seu médico.

- É necessário apresentar todos os resultados anteriores relacionados ao exame (mamografias / ultrassonografias / ressonâncias e biópsias) mesmo que tenham sido realizadas na MAGSCAN.

### **Contra-indicação**

- Este exame não é realizado em gestantes, salvo em situações nas quais ele seja absolutamente necessário. Neste caso, é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para consultar os médicos responsáveis.

- **Importante** - Necessário intervalo de 06 meses entre a cirurgia para colocação da prótese e a realização do exame.

- A mamografia **não** deve ser realizada após exames com uso de contraste endovenoso. Aguardar 2 dias se houve realização de algum exame relacionado abaixo:

- ✓ - Raios-X com contraste endovenoso;
- ✓ - Tomografia com contraste endovenoso;
- ✓ - Ressonância com contraste endovenoso;
- ✓ - Medicina Nuclear;

<p style="text-align: center;">EXAMES RADIOLÓGICOS CONVENCIONAIS – RX SIMPLES</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame não precisa ser agendado com antecedência, sendo o atendimento realizado conforme ordem de chegada, sendo realizado das 17h30 de segunda à sexta-feira e de 7h as 11h30 aos sábados.</li> <li>- Este exame não necessita de preparo.</li> <li>- Recomenda-se que sejam retirados objetos de adorno tais como brincos, colares, correntes etc.</li> <li>- Algumas radiografias como, por exemplo, radiografias panorâmicas dos membros inferiores e RX de coluna para escoliose necessitam que o paciente consiga manter a posição em pé (ortostase).</li> </ul>
---	---

#### TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA

<p>TC ABDOME TOTAL (ABDOME SUPERIOR, PELVE E RETROPERITÔNIO)</p> <p>TC VIAS URINÁRIAS (URO TOMOGRAFIA) (TUSS)</p> <p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA PELVE OU BACIA (AMB)</p> <p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO ABDÔMEN SUPERIOR</p>	<p><b>Agendamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica e pode ser feito com anestesia, se necessário (apresentar pedido médico).</li> <li>-Este exame poderá ser realizado com contraste iodado. Deve-se preencher o questionário de segurança para exames com contraste.</li> <li>- Crianças entre 1 e 5 anos de idade e adultos que sabidamente não conseguem colaborar (Movimentos impedem a realização do exame), agendar Tomografia com Anestesia, conforme agenda e dias específicos.</li> </ul>
---	---

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Clientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.</li><li>- Mulheres com atraso menstrual ou incerteza em relação à gravidez: não devem realizar o exame. Apresentar teste de gravidez (Bhcg antes do exame).</li><li>- Gestantes: não realizar o exame caso não tenha autorização por escrito do médico solicitante. Adicionalmente deverá ser avaliado o real benefício do exame solicitado pelo médico radiologista da Clínica, sendo assim:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ - Gestantes com documento do médico confirmando a gestação e autorizando a realização da tomografia solicitada, e com aprovação do médico radiologista da Clínica devem: Assinar termo de consentimento do exame autorizando a realização do mesmo e afirmando estarem cientes dos potenciais riscos.</li><li>✓ O exame será realizado com o uso do avental de Chumbo, cedido na unidade, caso o segmento a ser avaliado não seja o abdômen (exames do abdômen devem ser realizados sem avental de chumbo).</li></ul></li><li>- Não se recomenda a interrupção da amamentação para realização do exame ainda que seja necessária a administração do contraste. Em caso de dúvida entre em contato com a central de atendimento para maiores esclarecimentos sobre a segurança do procedimento.</li></ul>
--	--

- O uso do meio de contraste por via endovenosa, sempre que solicitado ou necessário, e quando autorizado pelo paciente, será avaliado por médico radiologista desta Clínica, que analisará a sua real necessidade, levando em consideração potenciais riscos e benefícios, em associação às condições clínicas do paciente. Sendo recomendado o mesmo após esta avaliação, será informado ao paciente o dia para realização do mesmo.

- Para as indicações de uso do contraste, é necessário apresentar o resultado de Creatinina recente (exame de sangue realizado nos últimos 60 dias) sempre que o paciente tenha acima de 60 anos, ou com as seguintes condições clínicas: quadro de doença renal aguda ou crônica, realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.

- Se solicitado pelo médico assistente ou a critério do médico radiologista, o exame poderá ser realizado com administração de contraste por via oral, nesses casos, o tempo de permanência do cliente no setor de imagem poderá variar de 1 hora, até 4 horas, podendo inclusive, em casos selecionados, ter que retornar no dia seguinte para imagens tardias.

- Em casos muito específicos, se solicitado pelo médico assistente ou a critério do médico radiologista, poderá ser necessário o uso do meio de contraste por via retal, mediante autorização do paciente.

- Caso em exames anteriores de ressonância magnética ou tomografia computadorizada o cliente tenha apresentado quadros de alergia após a utilização do contraste ou apresente alergia à medicamentos e/ou alimentos, entrar em contato com a central de

atendimento. Poderá ser necessário o preparo antialérgico antes da realização do exame, ou o mesmo poderá ser contraindicado (Pacientes alérgicos ao contraste iodado - reação moderada/grave - não poderão realizar o exame com contraste).

- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de Tomografia. Para clientes com peso superior a 130 kg e circunferência abdominal maior de 180 cm, favor entrar em contato com a Clínica. Cada caso será avaliado em particular, levando em consideração o segmento do corpo a ser estudada, a posição necessária durante a realização do exame, e, os limites de tolerância dos equipamentos.

- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

**Preparo:**

-No agendamento o paciente deve informar se tem antecedentes alérgicos à medicamentos ou alimentos;

- Preparo antialérgico é recomendado para pacientes com histórico alérgico e que necessitem realizar o contraste

endovenoso, a ser feito dois dias antes do exame (vide “preparo antialérgico”).

- Este exame requer um jejum de quatro horas.

- Suspensão de medicamentos:

✓ O cliente deve suspender, nas 48 horas que antecedem o exame e com o consentimento do médico assistente, o uso de medicamentos que contenham a **metformina** (Dimefor, Glifage, Glucoformin, Glucovance ou Starform, Avandamet, Aktos, Diaformin, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glucofage, Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Teutoformin) e a fenformina (Debei), que é **contraindicada nos exames com contraste iodado endovenoso**. A suspensão dessas medicações ainda precisa ser mantida por 48 horas após o exame.

✓ Além disso, clientes que fazem uso dos medicamentos sildenafil (Revatio e Viagra), tadalafila (Cialis) ou vardenafila (Levitra e Vivanza), não devem usar estes medicamentos nas 48 horas que antecedem o exame e nas 24 horas após o exame.

- O cliente deve apresentar resultados de exames anteriores, sempre que houver.

- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem joias, brincos, pingentes ou piercing, ou retirados antes do procedimento.

TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO  
TÓRAX

**Agendamento:**

- Este exame deve ser agendado com antecedência.

- Este exame é realizado somente com solicitação médica e pode ser feito com anestesia, se necessário (apresentar pedido médico).

- Crianças entre 1 e 5 anos de idade e adultos que não conseguem colaborar (Movimentos impedem a realização do exame), agendar Tomografia com Anestesia, conforme agenda e dias específicos.

- Clientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.

- Mulheres com atraso menstrual ou incerteza em relação à gravidez: não devem realizar o exame. Apresentar teste de gravidez (Bhcg antes do exame).

- Gestantes: não realizar o exame caso não tenha autorização por escrito do médico solicitante. Adicionalmente deverá ser avaliado o real benefício do exame solicitado pelo médico radiologista da Clínica, sendo assim:

- ✓ - Gestantes com documento do médico confirmando a gestação e autorizando a realização da tomografia solicitada, e com aprovação do médico radiologista da Clínica devem: Assinar termo de consentimento do exame autorizando a realização do mesmo e afirmando estarem cientes dos potenciais riscos.

✓ O exame será realizado com o uso do avental de Chumbo, cedido na unidade. (se solicitado também exame do abdômen em conjunto, os exames devem ser realizados sem avental de chumbo).

- Este exame geralmente não necessita da utilização do meio de contraste, exceto para casos específicos.

- O uso do meio de contraste por via endovenosa, sempre que solicitado ou necessário, e quando autorizado pelo paciente, será avaliado por médico radiologista desta Clínica, que analisará a sua real necessidade, levando em consideração potenciais riscos e benefícios, em associação às condições clínicas do paciente. Sendo recomendado o mesmo após esta avaliação, será informado ao paciente o dia para realização do mesmo.

- Para as indicações de uso do contraste, é necessário apresentar o resultado de Creatinina recente (exame de sangue realizado nos últimos 60 dias) sempre que o paciente tenha acima de 60 anos, ou com as seguintes condições clínicas: quadro de doença renal aguda ou crônica, realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.

- Caso em exames anteriores de ressonância magnética ou tomografia computadorizada o cliente tenha apresentado quadros de alergia após a utilização do contraste OU apresente alergia à medicamentos e/ou alimentos, entrar em contato com a central de atendimento. Poderá ser necessário o preparo antialérgico antes da realização do exame, ou o mesmo poderá ser contraindicado (Pacientes alérgicos ao contraste iodado - reação

moderada/grave - não poderão realizar o exame com contraste).

- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de Tomografia. Para clientes com peso superior a 130 kg e circunferência abdominal maior de 180 cm, favor entrar em contato com a Clínica. Cada caso será avaliado em particular, levando em consideração o segmento do corpo a ser estudada, a posição necessária durante a realização do exame, e, os limites de tolerância dos equipamentos.

- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

-No agendamento o paciente deve informar se tem antecedentes alérgicos a medicamentos ou alimentos;

- Preparo antialérgico poderá ser recomendado para pacientes com histórico alérgico e que venham a realizar o contraste endovenoso, a ser feito dois dias antes do exame (vide "preparo antialérgico").

- Este exame, se realizado sem contraste, como o é na maioria dos

	<p>casos, não requer jejum nem suspensão de medicamentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver.</li> <li>- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem joias, brincos ou pingentes, sendo recomendada a retirada de piercings.</li> </ul>
<p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO OU ÓRBITAS OU SELA TÚRSICA (AMB)</p> <p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE OU SEIOS DA FACE (AMB)</p> <p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE MASTÓIDES OU OUVIDOS (AMB)</p>	<p><b>Agendamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame é realizado por ordem de chegada de segunda à sexta-feira de 7h às 18h e sábado de 7h às 11h30.</li> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica e pode ser feito com anestesia, se necessário (apresentar pedido médico).</li> <li>- Deve-se preencher o questionário de segurança para exames com contraste iodado.</li> <li>- Crianças entre 1 e 5 anos de idade e adultos que não conseguem colaborar (Movimentos impedem a realização do exame), agendar Tomografia com Anestesia, conforme agenda e dias específicos.</li> <li>- Clientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.</li> <li>- Mulheres com atraso menstrual ou incerteza em relação à gravidez: não devem realizar o exame. Apresentar teste de gravidez (Bhcg antes do exame).</li> <li>- Gestantes: não realizar o exame caso não tenha autorização por escrito do médico solicitante. Adicionalmente</li> </ul>

deverá ser avaliado o real benefício do exame solicitado pelo médico radiologista da Clínica, sendo assim:

✓ - Gestantes com documento do médico confirmando a gestação e autorizando a realização da tomografia solicitada, e com aprovação do médico radiologista da Clínica devem: Assinar termo de consentimento do exame autorizando a realização do mesmo e afirmando estarem cientes dos potenciais riscos.

✓ O exame será realizado com o uso do avental de Chumbo, cedido na unidade, caso o segmento a ser avaliado não seja o abdômen (exames do abdômen devem ser realizados sem avental de chumbo).

- Não se recomenda a interrupção da amamentação para realização do exame ainda que seja necessária a administração do contraste. Em caso de dúvida entre em contato com a central de atendimento para maiores esclarecimentos sobre a segurança do procedimento.

- O uso do meio de contraste por via endovenosa, sempre que solicitado ou necessário, e quando autorizado pelo paciente, será avaliado por médico radiologista desta Clínica, que analisará a sua real necessidade, levando em consideração potenciais riscos e benefícios, em associação às condições clínicas do paciente. Sendo recomendado o mesmo após esta avaliação, será informado ao paciente o dia para realização do mesmo.

- Para as indicações de uso do contraste, é necessário apresentar o

resultado de Creatinina recente (exame de sangue realizado nos últimos 60 dias) sempre que o paciente tenha acima de 60 anos, ou com as seguintes condições clínicas: quadro de doença renal aguda ou crônica, realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.

- Caso em exames anteriores de ressonância magnética ou tomografia computadorizada o cliente tenha apresentado quadros de alergia após a utilização do contraste OU apresente alergia à medicamentos e/ou alimentos, entrar em contato com a central de atendimento. Poderá ser necessário o preparo antialérgico antes da realização do exame, ou o mesmo poderá ser contraindicado (Pacientes alérgicos ao contraste iodado - reação moderada/grave - não poderão realizar o exame com contraste).

- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de Tomografia. Para clientes com peso superior a 130 kg e circunferência abdominal maior de 180 cm, favor entrar em contato com a Clínica. Cada caso será avaliado em particular, levando em consideração o segmento do corpo a ser estudada, a posição necessária durante a realização do exame, e, os limites de tolerância dos equipamentos.

- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem

previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

-No agendamento o paciente deve informar se tem antecedentes alérgicos à medicamentos ou alimentos;

- Preparo antialérgico é recomendado para pacientes com histórico alérgico e que necessitem realizar o contraste endovenoso, a ser feito dois dias antes do exame (vide “preparo antialérgico”).

- Este exame requer jejum de 04 horas no caso de indicar-se uso do meio de contraste endovenoso.

- Suspensão de medicamentos

✓ O cliente deve suspender, nas 48 horas que antecedem o exame com contraste endovenoso e com o consentimento do seu médico assistente, o uso de medicamentos que contenham a **metformina** (Dimefor, Glifage, Glucoformin, Glucovance ou Starform, Avandamet, Aktos, Diaformin, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glucofage, Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Teutoformin) e a fenformina (Debei), que é **contraindicada nos exames com contraste iodado endovenoso**. A suspensão dessas medicações ainda precisa ser mantida por 48 horas após o exame.

✓ Além disso, clientes que fazem uso dos medicamentos

	<p>sildenafil (Revatio e Viagra), tadalafila (Cialis) ou vardenafila (Levitra e Vivanza), não devem usar estes medicamentos nas 48 horas que antecedem o exame e nas 24 horas após o exame.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O cliente deve apresentar resultados de exames anteriores, sempre que houver.</li> <li>- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem joias, brincos, pingentes ou piercing, ou retirados antes do procedimento.</li> <li>- No segmento de órbitas, face, mastóide e crânio, deve-se retirar aparelhos dentários removíveis antes da realização do exame.</li> </ul>
<p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DOS SEGMENTOS APENDICULARES (AMB)</p> <p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO JOELHO (TAGT)</p> <p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DAS ARTICULAÇÕES (AMB)</p> <p>TC TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL, DORSAL OU LOMBAR, ATÉ TRÊS SEGMENTOS (INTER-ESPAÇOS OU CORPOS VERTEBRAIS) (AMB)</p>	<p><b>Agendamento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Este exame é realizado por ordem de chegada de segunda a sexta-feira de 7h as 18h e sábado de 7h as 11h30.</li> <li>- Este exame é realizado somente com solicitação médica e pode ser feito com anestesia, se necessário (apresentar pedido médico).</li> <li>- Crianças entre 1 e 5 anos de idade, que não conseguem colaborar (Movimentos impedem a realização do exame), agendar Tomografia com Anestesia, conforme agenda e dias específicos.</li> <li>- Clientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mulheres com atraso menstrual ou incerteza em relação à gravidez: não devem realizar o exame. Apresentar teste de gravidez (Bhcg antes do exame).</li><li>- Gestantes: não realizar o exame caso não tenha autorização por escrito do médico solicitante. Adicionalmente deverá ser avaliado o real benefício do exame solicitado pelo médico radiologista da Clínica, sendo assim:<ul style="list-style-type: none"><li>✓ - Gestantes com documento do médico confirmando a gestação e autorizando a realização da tomografia solicitada, e com aprovação do médico radiologista da Clínica devem: Assinar termo de consentimento do exame autorizando a realização do mesmo e afirmando estarem cientes dos potenciais riscos.</li><li>✓ O exame será realizado com o uso do avental de Chumbo, cedido na unidade. (se solicitado também exame do abdômen em conjunto, os exames devem ser realizados sem avental de chumbo).</li></ul></li><li>- Este exame geralmente não necessita da utilização do meio de contraste, exceto para casos específicos.</li><li>- O uso do meio de contraste por via endovenosa, sempre que solicitado ou necessário, e quando autorizado pelo paciente, será avaliado por médico radiologista desta Clínica, que analisará a sua real necessidade, levando em consideração potenciais riscos e benefícios, em associação às condições clínicas do paciente. Sendo recomendado o mesmo após esta</li></ul>
--	---

avaliação, será informado ao paciente o dia para realização do mesmo.

- Para as indicações de uso do contraste, é necessário apresentar o resultado de Creatinina recente (exame de sangue realizado nos últimos 60 dias) sempre que o paciente tenha acima de 60 anos, ou com as seguintes condições clínicas: quadro de doença renal aguda ou crônica, realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.

- Caso em exames anteriores de ressonância magnética ou tomografia computadorizada o cliente tenha apresentado quadros de alergia após a utilização do contraste OU apresente alergia à medicamentos e/ou alimentos, entrar em contato com a central de atendimento. Poderá ser necessário o preparo antialérgico antes da realização do exame, ou o mesmo poderá ser contraindicado (Pacientes alérgicos ao contraste iodado - reação moderada/grave - não poderão realizar o exame com contraste).

- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de Tomografia. Para clientes com peso superior a 130 kg e circunferência abdominal maior de 180 cm, favor entrar em contato com a Clínica. Cada caso será avaliado em particular, levando em consideração o segmento do corpo a ser estudada, a posição necessária durante a realização do exame, e, os limites de tolerância dos equipamentos.

- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e

	<p>médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.</p> <p><b>Preparo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-No agendamento o paciente deve informar se tem antecedentes alérgicos a medicamentos ou alimentos;</li> <li>- Preparo antialérgico é recomendado para pacientes com histórico alérgico e que necessitem realizar o contraste endovenoso, a ser feito dois dias antes do exame (vide “preparo antialérgico”).</li> <li>- Este exame, se realizado sem contraste, como o é na maioria dos casos, não requer jejum nem suspensão de medicamentos.</li> <li>- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver.</li> <li>- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem joias, brincos ou pingentes, sendo recomendada a retirada de piercings.</li> </ul>
<p>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA – DENTAL SCAN – MANDÍBULA E MAXILA</p>	<p>Trata-se de exame de tomografia computadorizada da arcada dentária superior e/ou inferior;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Critérios de realização <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Exame realizado somente com solicitação médica.</li> <li>✓ O exame poderá ser realizado com anestesia, se necessário.</li> </ul> </li> </ul>

✓ Crianças entre 1 e 5 anos de idade, agendar Tomografia com Anestesia

✓ A anestesia, está disponível e é sugerida para crianças entre 1 a 4 anos (4 anos, 11 meses e 30 dias) e para crianças maiores e adultos que sabidamente tenham dificuldades de colaborar, por exemplo, em casos de claustrofobia.

- Clientes menores de 18 anos deverão vir acompanhados de um responsável legal.

- Este exame não é realizado em gestantes, salvo em situações nas quais ele seja absolutamente necessário. Neste caso, é necessário entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente para consultar os médicos responsáveis.

- Não se recomenda a interrupção da amamentação para realização do exame ainda que seja necessário a administração do contraste. Em caso de dúvida entre em contato com a central de atendimento para maiores esclarecimentos sobre a segurança do procedimento.

- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem joias, brincos ou pingentes, sendo recomendada a retirada de piercings.

- Este exame geralmente não necessita da utilização do meio de contraste, exceto para casos específicos.

- O uso do meio de contraste por via endovenosa, sempre que solicitado ou necessário, e quando autorizado pelo paciente, será avaliado por médico radiologista desta Clínica, que analisará a sua real necessidade, levando em consideração potenciais riscos e

benefícios, em associação às condições clínicas do paciente. Sendo recomendado o mesmo após esta avaliação, será informado ao paciente o dia para realização do mesmo.

- Para as indicações de uso do contraste, é necessário apresentar o resultado de Creatinina recente (exame de sangue realizado nos últimos 60 dias) sempre que o paciente tenha acima de 60 anos, ou com as seguintes condições clínicas: quadro de doença renal aguda ou crônica, realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.

- Caso em exames anteriores de ressonância magnética ou tomografia computadorizada o cliente tenha apresentado quadros de alergia após a utilização do contraste OU apresente alergia à medicamentos e/ou alimentos, entrar em contato com a central de atendimento. Poderá ser necessário o preparo antialérgico antes da realização do exame, ou o mesmo poderá ser contraindicado (Pacientes alérgicos ao contraste iodado - reação moderada/grave - não poderão realizar o exame com contraste).

- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de Tomografia. Para clientes com peso superior a 130 kg e circunferência abdominal maior de 180 cm, favor entrar em contato com a Clínica. Cada caso será avaliado em particular, levando em consideração o segmento do corpo a ser estudada, a posição necessária durante a realização do exame, e, os limites de tolerância dos equipamentos.

- Devem ser apresentados resultados anteriores, se houver;

	<p>- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.</p> <p><b>Preparo</b></p> <p>-No agendamento o paciente deve informar se tem antecedentes alérgicos a medicamentos ou alimentos;</p> <p>- Preparo antialérgico é recomendado para pacientes com histórico alérgico e que necessitem realizar o contraste endovenoso, a ser feito dois dias antes do exame (vide “preparo antialérgico”).</p> <p>- Este exame, se realizado sem contraste, como o é na maioria dos casos, não requer jejum nem suspensão de medicamentos.</p> <p>- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver.</p> <p>- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem joias, brincos ou pingentes, sendo recomendada a retirada de piercings.</p>
<p>TC ANGIO TC CARDÍACO - ANGIO TC DAS ARTÉRIAS CORONÁRIAS</p>	<p><b>Instruções</b></p> <p>- Trata-se de tomografia computadorizada das artérias coronárias, um exame destinado a permitir a avaliação das artérias do coração.</p>

**ATENÇÃO:**

- O EXAME COMO UM TODO PODE DEMORAR ATÉ 2 HORAS, A DEPENDER PRINCIPALMENTE DA FREQUÊNCIA CARDÍACA BASAL DO PACIENTE.

**Critérios de realização**

-Este exame deve ser agendado com antecedência.

- Este exame é realizado somente com solicitação médica.

- Antes de agendar os pacientes devem responder as perguntas do QUESTIONÁRIO de segurança para exames com contraste IODADO e logo após encaminhar para central de marcação.

- Clientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.

- Este exame não é realizado em menores de 12 anos de idade ou em clientes, tanto crianças maiores de 12 anos quanto adultos, que sabidamente tenham dificuldade de colaborar (Permanecer sem se movimentar durante TODO exame) - por exemplo, em casos de claustrofobia ou pacientes especiais. Nestes casos entrar em contato com a clínica para verificar a possibilidade do agendamento do exame com anestesia e mediante solicitação médica.

- Mulheres com atraso menstrual ou incerteza em relação à gravidez: não devem realizar o exame. Apresentar teste de gravidez (Bhcg antes do exame).

- Gestantes: não realizar o exame caso não tenha autorização por escrito do médico solicitante. Adicionalmente deverá ser avaliado o real benefício do exame solicitado pelo médico radiologista da Clínica, sendo assim:

✓ - Gestantes com documento do médico confirmando a gestação e autorizando a realização da tomografia solicitada, e com aprovação do médico radiologista da Clínica devem: Assinar termo de consentimento do exame autorizando a realização do mesmo e afirmando estarem cientes dos potenciais riscos.

✓ O exame será realizado com o uso do avental de Chumbo, se gestante;

- Não se recomenda a interrupção da amamentação para realização do exame ainda que seja necessária a administração do contraste. Em caso de dúvida entre em contato com a central de atendimento para maiores esclarecimentos sobre a segurança do procedimento.

- Para as indicações de uso do contraste, é necessário apresentar o resultado de Creatinina recente (realizado nos últimos 60 dias) em pacientes acima de 60 anos, ou com as seguintes condições clínicas: quadro de doença renal aguda ou crônica, realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.

- Caso em exames anteriores de ressonância magnética ou tomografia computadorizada o cliente tenha apresentado quadros de alergia após a

utilização do contraste OU apresente alergia à medicamentos e/ou alimentos, entrar em contato com a central de atendimento. Poderá ser necessário o preparo antialérgico antes da realização do exame, ou o mesmo poderá ser contraindicado. Informe como foi a reação alérgica, quais sintomas apresentados e se foi necessário uso de medicação ou internação pelos sintomas alérgicos.

**-Pacientes alérgicos ao contraste iodado (reação moderada/grave) não poderão realizar o exame com contraste.**

- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem materiais metálicos na região do tórax e do pescoço, tais como joias, brincos, correntes ou pingentes, sendo recomendada a retirada de piercings.

- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de Tomografia. Para clientes com peso superior a 130 kg e circunferência abdominal maior de 180 cm, favor entrar em contato com a Clínica. Cada caso será avaliado em particular, levando em consideração o segmento do corpo a ser estudada, a posição necessária durante a realização do exame, e, os limites de tolerância dos equipamentos.

- O cliente deve apresentar resultados anteriores, se houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem

previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

- Este exame requer um jejum de quatro horas;

- Chegar à clínica com antecedência de pelo menos 30 minutos antes do horário do exame;

- Trazer exame de uréia e creatinina (de pelo menos 3 meses );

- Trazer sua receita com medicações de uso diário;

- Trazer seus exames cardíacos anteriores;

- Suspensão de medicamentos:

O cliente deve suspender, nas 48 horas que antecedem o exame e com o consentimento do médico assistente, o uso de medicamentos que contenham a metformina (Dimefor, Glifage, Glucoformin, Glucovance ou Starform, Avandamet, Aktos, Diaformin, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glucofage, Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Teutoformin) e a fenformina (Debei), que é contraindicado nos exames com contraste iodado endovenoso. A suspensão dessas medicações ainda precisa ser mantida por 48 horas após o exame.

✓ Além disso, clientes que fazem uso dos medicamentos sildenafil (Revatio e Viagra), tadalafila (Cialis) ou vardenafila (Levitra e Vivanza), não devem usar estes medicamentos nas 48 horas que antecedem o exame e nas 24 horas após o exame.

**ATENÇÃO:** Todos os demais medicamentos de uso contínuo devem

	<p>ser ingeridos no horário habitual com pequena quantidade de água, especialmente os medicamentos relacionados ao coração e ao controle da pressão arterial. A suspensão desses medicamentos pode alterar o ritmo cardíaco, prejudicando o exame.</p>
<p>TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, ESCORE CORONARIANO DE CÁLCIO, QUANTIFICAÇÃO ( TC TÓRAX)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- O procedimento consiste em uma tomografia computadorizada do coração <b>sem uso de contraste</b>.</li> <li>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</li> <li>- O exame é realizado somente com solicitação médica .</li> <li>- Não é necessária a utilização do meio de contraste.</li> <li>- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de Tomografia. Para clientes com peso superior a 130 kg e circunferência abdominal maior de 180 cm, favor entrar em contato com a Clínica. Cada caso será avaliado em particular, levando em consideração o segmento do corpo a ser estudada, a posição necessária durante a realização do exame, e, os limites de tolerância dos equipamentos.</li> <li>- O cliente deve apresentar resultados anteriores de exames relacionados, se houver.</li> <li>- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem joias, brincos ou pingentes, sendo recomendada a retirada de piercings.</li> <li>- Mulheres com atraso menstrual ou incerteza em relação à gravidez: não devem realizar o exame. Apresentar</li> </ul>

teste de gravidez (Bhcg antes do exame).

- Gestantes: não realizar o exame caso não tenha autorização por escrito do médico solicitante. Adicionalmente deverá ser avaliado o real benefício do exame solicitado pelo médico radiologista da Clínica, sendo assim:

✓ - Gestantes com documento do médico confirmando a gestação e autorizando a realização da tomografia solicitada, e com aprovação do médico radiologista da Clínica devem: Assinar termo de consentimento do exame autorizando a realização do mesmo e afirmando estarem cientes dos potenciais riscos.

✓ O exame será realizado com o uso do avental de Chumbo, se gestante;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

- Esta tomografia não requer nenhum tipo de preparo, nem mesmo jejum;

	<p>- Suspensão de medicamentos: O cliente não precisa suspender nenhum tipo de medicamento.</p>
<p>TC ANGIO TC DE AORTA / ILÍACAS  TC ANGIO TC DE AORTA / RENAS  TC ANGIO TC DE AORTA ABDOMINAL  TC ANGIO TC DE ARTÉRIAS ILÍACAS  TC ANGIO TC DE ARTÉRIAS RENAS  TC ANGIO TC DE CAROTIDAS / VERTEBRAIS  TC ANGIO TC DE CRÂNIO  TC ANGIO TC DE MEMBROS INFERIORES  TC ANGIO TC DE PELVE  TC ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR  TC ANGIOTOMOGRAFIA ARTERIAL DE TÓRAX</p>	<p><b>Agendamento:</b></p> <p>- Este exame deve ser agendado com antecedência.</p> <p>- Só poderá ser realizado com a utilização do meio de contraste iodado intravenoso. Portanto caso haja contra-indicação ao uso do mesmo, o exame não poderá ser realizado.</p> <p>- Este exame é realizado somente com solicitação médica e pode ser feito com anestesia, se necessário (apresentar pedido médico).</p> <p>- Crianças entre 1 e 5 anos de idade, agendar Tomografia com Anestesia, conforme agenda e dias específicos.</p> <p>- Clientes menores de 18 anos devem estar acompanhados de um responsável legal, que precisa permanecer na unidade até o fim do procedimento.</p> <p>- Mulheres com atraso menstrual ou incerteza em relação à gravidez: não devem realizar o exame. Apresentar teste de gravidez (Bhcg antes do exame).</p> <p>- Gestantes: não realizar o exame caso não tenha autorização por escrito do médico solicitante. Adicionalmente deverá ser avaliado o real benefício do exame solicitado pelo médico radiologista desta Clínica, sendo assim:</p> <p>✓ - Gestantes com documento do médico confirmando a gestação e autorizando a realização da tomografia solicitada, e com</p>

aprovação do médico radiologista desta Clínica devem: Assinar termo de consentimento do exame autorizando a realização do mesmo e afirmando estarem cientes dos potenciais riscos.

- ✓ O exame será realizado com o uso do avental de Chumbo, cedido na unidade, caso o segmento a ser avaliado não seja o abdômen (exames do abdômen devem ser realizados sem avental de chumbo).

- Não se recomenda a interrupção da amamentação para realização do exame ainda que seja necessária a administração do contraste. Em caso de dúvida entre em contato com a central de atendimento para maiores esclarecimentos sobre a segurança do procedimento.

- Este exame necessita do uso do contraste endovenoso, sendo necessário apresentar o resultado de Creatinina recente (exame de sangue realizado nos últimos 60 dias) sempre que o paciente tenha acima de 60 anos, ou com as seguintes condições clínicas: quadro de doença renal aguda ou crônica, realizado transplante renal ou procedimento cirúrgico de rins e/ou vias urinárias.

- Caso em exames anteriores de ressonância magnética ou tomografia computadorizada o cliente tenha apresentado quadros de alergia após a utilização do contraste OU apresente alergia à medicamentos e/ou alimentos, entrar em contato com a central de atendimento. Poderá ser necessário o preparo anti-alérgico antes da realização do exame, ou o mesmo

poderá ser contraindicado. Informe como foi a reação alérgica, quais sintomas apresentados e se foi necessário uso de medicação ou internação pelos sintomas alérgicos.

**-Pacientes alérgicos ao contraste iodado (reação moderada/grave) não poderão realizar o exame com contraste.**

- A execução do exame depende da adequada acomodação do cliente no equipamento de Tomografia. Para clientes com peso superior a 130 kg e circunferência abdominal maior de 180 cm, favor entrar em contato com a Clínica. Cada caso será avaliado em particular, levando em consideração o segmento do corpo a ser estudada, a posição necessária durante a realização do exame, e, os limites de tolerância dos equipamentos.

- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver;

- Clientes acamados ou hospitalizados somente poderão ser atendidos nas unidades de atendimento caso estejam acompanhados de ambulância e médico assistente, que deverão permanecer na unidade durante toda a realização do exame e até o término do mesmo. É necessário contato hospitalar com nossa equipe de enfermagem previamente para informar condições clínicas do paciente.

### **Preparo**

-No agendamento o paciente deve informar se tem antecedentes alérgicos a medicamentos ou alimentos;

- Preparo antialérgico é recomendado para pacientes com histórico alérgico

não grave, a ser feito dois dias antes do exame (vide “preparo antialérgico”).

- Este exame requer um jejum de quatro horas.

- Suspensão de medicamentos

✓ O cliente deve suspender, nas 48 horas que antecedem o exame e com o consentimento do médico assistente, o uso de medicamentos que contenham a metformina (Dimefor, Glifage, Glucoformin, Glucovance ou Starform, Avandamet, Aktos, Diaformin, Formet, Galvus, Glicefor, Glicomet, Glucofage, Meguanin, Metfordin, Metform, Metformina, Metformix, Neo Metformin, Teutoformin) e a fenformina (Debei), que é contraindicado nos exames com contraste iodado endovenoso. A suspensão dessas medicações ainda precisa ser mantida por 48 horas após o exame.

- O cliente deve apresentar resultados anteriores, sempre que houver.

- Para a realização do procedimento, deve-se comparecer à unidade sem joias, brincos ou pingentes, sendo recomendada a retirada de piercings.